

大腸がんレジメン

* 患者さんの状態に合わせて投与量やスケジュールが変更になることがあります

FOLFOX4療法

FOLFOLX4療法	1コースの日数		14 日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
フルオロウラシル	600mg/m2		点滴静注	22hr	day1,2
オキサリプラチン	85mg/m2		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	100mg/m2		点滴静注	2hr	day1,2
フルオロウラシル	400mg/m2		点滴静注	bolus	day1,2

mFOLFOX6療法

mFOLFOX6療法		1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)	
	標準値	上限値				
オキサリプラチン	85mg/m2		点滴静注	2hr	day1	
レボホリナート	200mg/m2		点滴静注	2hr	day1	
フルオロウラシル	400mg/m2		点滴静注	15min	day1	
フルオロウラシル	2400mg/m2		点滴静注	46hr	day1	

XELOX療法

XELOX療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
カベシタピン	1000mg/m ² /回	を1日2回	経口		day 1～14
オキサリプラチン	130mg/m ²		点滴静注	2hr	day 1

SOX療法

SOX療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
S1	添書通り:80～120mg/日		経口		day 1～14
オキサリプラチン	130mg/m ²		点滴静注	2hr	day 1

Bevacizumab＋FOLFOXIRI療法

Bevacizumab＋FOLFOXIRI療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベバシズマブ	5mg/kg		点滴静注	30～90分	day1
イリノテカン	165mg/m2		点滴静注	90分	day1
オキサリプラチン	85mg/m2		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	200mg/m2		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	3200mg/m2		点滴静注	46hr	day1-3

Cetuximab＋ピラフトビ＋メクトビ療法療法

Getuximab+ピラフトビ+メクトビ療法療法	1コースの日数		7日		投与日(1クール)
	1回投与量		投与経路	投与時間	
	標準値	上限値			
【初回】アービタックス	400mg/m2		点滴静注	2hr	初回のday1
【2回目以降】アービタックス	250mg/m2		点滴静注	1hr	day1
ピラフトビ(エンコラフェニブ)	300mg/分1		経口		連日
メクトビ(ピニメチニブ)	90mg/分2		経口		連日

■ オキサリプラチン系+Bev ■

Bevacizumab＋FOLFOX4療法		1コースの日数	14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
フルオロウラシル	600mg/m ²		点滴静注	22hr	day1,2
オキサリプラチン	85mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	100mg/m ²		点滴静注	2hr	day1,2
フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴静注	全開	day1,2
ペバシズマブ	5mg/kg		点滴静注	30～90分	day1

Bevacizumab＋mFOLFOX6 療法		1コースの日数	14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ペバシズマブ	5mg/kg		点滴静注	30～90分	day1
オキサリプラチン	85mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	200mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴静注	15min	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴静注	46hr	day1

Bevacizumab＋XELOX療法		1コースの日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
カベシタピン	1000mg/m ² /回	を1日2回	経口		day 1～14
オキサリプラチン	130mg/m ²		点滴静注	2hr	day 1
ペバシズマブ	7.5mg/kg		点滴静注	90分	day 1

Bevacizumab＋SOX療法		1コースの日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
S1	添書通り:80～120mg/日		経口		day 1～14
ペバシズマブ	7.5mg/kg		点滴静注	30～90分	day 1
オキサリプラチン	130mg/m ²		点滴静注	2hr	day 1

Bevacizumab＋S1療法		1コースの日数	42日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ペバシズマブ	5mg/kg		点滴静注	30～90分	day 1、15、29
S1	用法用量通り		経口		day1～28

Bevacizumab＋IFL療法		1コースの日数	42日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イリノテカン	100mg/m ²		点滴静注	90分	day1、8、15、22
フルオロウラシル	500mg/m ²		急速静注		day1、8、15、22
レボホリナート	10mg/m ²		急速静注		day1、8、15、22
ペバシズマブ	5mg/kg		点滴静注	30～90分	day1、15、29

Bevacizumab(2週間毎)+経口抗がん剤併用		1コースの日数	28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ペバシズマブ	5mg/kg		点滴静注	30～90分	day 1、15
内服薬併用の場合(例)					
UFT	300mg/m ² /日		経口		day1～21
ユーゼル	75mg/日		経口		day1～21

Bevacizumab＋ゼローダ療法		1コースの日数	21日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
ペバシズマブ	7.5mg/kg		点滴静注	30～90分	day1
カベシタピン	1000mg/m ² /回	を1日2回d			d1から15

■ オキサリプラチン系+Pan ■

Panitumumab＋FOLFOX4療法		1コースの日数	14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベクティビックス	6mg/kg		点滴静注	60min以上	day1
フルオロウラシル	600mg/m2		点滴静注	22hr	day1,2
オキサリプラチン	85mg/m2		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	100mg/m2		点滴静注	2hr	day1,2
フルオロウラシル	400mg/m2		点滴静注	全開	day1,2

Panitumumab＋mFOLFOX6療法		1コースの日数	14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベクティビックス	6mg/kg		点滴静注	60min以上	day1
オキサリプラチン	85mg/m2		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	200mg/m2		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	400mg/m2		点滴静注	15min	day1
フルオロウラシル	2400mg/m2		点滴静注	46hr	day1

■ CPT11 系 レジメン ■

イリノテカン単独療法		1コースの日数	-		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イリノテカン					
【A法】	100mg/m2		点滴静注	90min	day1,8,15,(22) [3-4回]その後2週間休業
【B法】	150mg/m2		点滴静注	90min	day1,15,(29) [2-3回]その後3週間休業
その他	150mg/m2		点滴静注	90min	day1,15 1コース:28日

FOLFIRI療法		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イリノテカン	150mg/m2		点滴静注	2時間(90分)	day1
フルオロウラシル	2400mg/m2(46hでの総量)		点滴静注	46時間	day1
レボホリナート	200mg/m2		点滴静注	2時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m2		静注	全開	day1

S1＋CPT11【IRIS:28日】療法		1コースの日数	28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イリノテカン	100mg/m2	(125mg/m2)	点滴静注	90分	day1,15
S1	用法用量通り	80mg/m2	経口		day1～14

■ CPT11 系 ＋ Bev ■

Bevacizumab＋FOLFIRI療法		1コースの日数	14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベバシズマブ	5mg/kg	10mg/kg	点滴静注	30～90min	day1
レボホリナート	200mg/m2		点滴静注	2hr	day1
イリノテカン	150mg/m2		点滴静注	2hr(90min)	day1
フルオロウラシル (A)	400mg/m2		急速静注	全開	day1
フルオロウラシル (B)	2400mg/m2		持続静注	46hr	day1, 2, 3 (3日間合計で左記の投与量！)

Bevacizumab＋S1＋CPT-11【IRIS:28日】		1コースの日数	28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベバシズマブ	5mg/kg		点滴静注	30～90min	day1,15
イリノテカン	100mg/m2		点滴静注	90分	day1,15
TS-1	用法用量通り		経口		day1～14

■ CPT11 系 + Cet ■

Cetuximab+CPT11療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【初回】アービタックス	400mg/m2		点滴静注	2hr	初回のday1 初回のみ400mg/m2です
【2回目以降】アービタックス	250mg/m2		点滴静注	1hr	day1、8、15、22
イリノテカン	100mg/m2		点滴静注	90min	day1、15

Cetuximab+FOLFIRI 療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【初回】アービタックス	400mg/m2		点滴静注	2hr	初回のday1 初回のみ400mg/m2です
【2回目以降】アービタックス	250mg/m2		点滴静注	1hr	day1、8
イリノテカン	150mg/m2		点滴静注	2hr(90min)	day1
フルオロウラシル	2400mg/m2		点滴静注	46hr	day1～3(46h合計で2400mg/m2)
レボホリナート	200mg/m2		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	400mg/m2		急速静注	全開	day1

■ オキサリプラチン系 + Cet ■

Cetuximab+FOLFOX4療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
フルオロウラシル	600mg/m2		点滴静注	22hr	day1,2
オキサリプラチン	85mg/m2		点滴静注	2hr	day1
レボホリナート	100mg/m2		点滴静注	2hr	day1,2
フルオロウラシル	400mg/m2		点滴静注	全開	day1,2
アービタックス	500mg/m2		点滴静注	2hr	day1

■ Cet ■

Cetuximab単独療法	1コースの日数		7日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【初回】アービタックス	400mg/m2		点滴静注	2hr	初回のday1 初回のみ400mg/m2です
【2回目以降】アービタックス	250mg/m2		点滴静注	1hr	day1

【2週毎】Cetuximab単独療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【初回】アービタックス	500mg/m2		点滴静注	2hr	day1

■ Pan ■

Panitumumab単独療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ペクティビックス	6mg/kg		点滴静注	60min以上	day1

■ CPT11 系 + Pan ■

Panitumumab+CPT11療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ペクティビックス	6mg/kg		点滴静注	60min以上	day1
イリノテカン	150mg/m2		点滴静注	90min	day1

Panitumumab+FOLFIRI療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ペクティビックス	6mg/kg		点滴静注	60min以上	day1
イリノテカン	150mg/m2		点滴静注	2hr(90min)	day1
フルオロウラシル	2400mg/m2		点滴静注	46hr	day1～3(46h合計で2400mg/m2)
レボホリナート	200mg/m2		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	400mg/m2		急速静注	全開	day1

Panitumumab+S1+CPT-11【IRIS:4週】	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ペクティビックス	6mg/kg		点滴静注	60min以上	day1,15
イリノテカン	100mg/m2	125mg/m2	点滴静注	90分	day1,15
TS-1	用法用量通り	80mg/m2	経口		day1～14

■ CPT11 系 + ラムシルマブ（サイラムザ）

ラムシルマブ+FOLFIRI療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
サイラムザ	8mg/kg		点滴静注	60min以上	day1
イリノテカン	150mg/m ²		点滴静注	2hr(90min)	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴静注	46hr	day1～3(46h合計で2400mg/m ²)
レボホリナート	200mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	400mg/m ²		急速静注	全開	day1

■ CPT11 系 + アフリベルセプト

アフリベルセプト+FOLFIRI療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ザルトラップ	4mg/kg		点滴静注	60min	day1
イリノテカン	150mg/m ²		点滴静注	2hr(90min)	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴静注	46hr	day1～3(46h合計で2400mg/m ²)
レボホリナート	200mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	400mg/m ²		急速静注	全開	day1

■ その他 ■

5FU/LV (RPMI)療法	1コースの日数		56日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
レボホリナート	250mg/m ²		点滴静注	2hr	day1、8、15、22、29、36
フルオロウラシル	600mg/m ²		急速静注		day1、8、15、22、29、36

キイトルーダ療法

抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キイトルーダ	200mg/body又は 400mg/body		点滴静注	30分	day1