

**泌尿器がんレジメン**

\* 患者さんの状態に合わせて投与量やスケジュールが変更になることがあります。

| ドセタキセル療法 |                     | 1コースの日数                  |      | 21日(添書)~28日         |           |
|----------|---------------------|--------------------------|------|---------------------|-----------|
|          | 1回投与量               |                          | 投与経路 | 投与時間                | 投与日(1クール) |
|          | 標準値                 | 上限値                      |      |                     |           |
| ドセタキセル   | 70mg/m <sup>2</sup> | 75mg/m <sup>2</sup> (添書) | 点滴静注 | 1.5時間<br>(添書:1時間以上) | day1      |

| ジェブダナ(カバジタキセル)療法 |                     | 1コースの日数 |      | 21日  |             |
|------------------|---------------------|---------|------|------|-------------|
| 薬剤名              | 1回投与量               |         | 投与経路 | 投与時間 | 投与日         |
|                  | 標準値                 | 上限値     |      |      |             |
| ジェブダナ            | 25mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 1時間  | day1        |
| [プレドニン]          | 10mgを分2(朝昼)         |         | 内服   |      | day1-21(連日) |

| GC(GEM+CBDCA)療法 |                      | 1コースの日数 |      | 28日  |           |
|-----------------|----------------------|---------|------|------|-----------|
| 抗癌剤名            | 1回投与量                |         | 投与経路 | 投与時間 | 投与日(1クール) |
|                 | 標準値                  | 上限値     |      |      |           |
| ゲムシタビン          | 800mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 30分  | day1,8,15 |
| カルボプラチン         | AUC=4                |         | 点滴静注 | 3時間  | day2      |

| GC(GEM+CDDP)療法 |                       | 1コースの日数 |      | 28日  |           |
|----------------|-----------------------|---------|------|------|-----------|
| 抗癌剤名           | 1回投与量                 |         | 投与経路 | 投与時間 | 投与日(1クール) |
|                | 標準値                   | 上限値     |      |      |           |
| ジェムザール         | 1000mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 30分  | day1,8,15 |
| シスプラチン         | 70mg/m <sup>2</sup>   |         | 点滴静注 | 2時間  | day2      |

| GN(GEM+N)療法 |                       | 1コースの日数 |      | 28日  |           |
|-------------|-----------------------|---------|------|------|-----------|
| 抗癌剤名        | 1回投与量                 |         | 投与経路 | 投与時間 | 投与日(1クール) |
|             | 標準値                   | 上限値     |      |      |           |
| ジェムザール      | 1000mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 30分  | day1,8,15 |
| アクプラ        | 100mg/m <sup>2</sup>  |         | 点滴静注 | 2時間  | day2      |

| M-VAC療法  |                     | 1コースの日数 |      | 28日   |               |
|----------|---------------------|---------|------|-------|---------------|
| 抗癌剤名     | 1回投与量               |         | 投与経路 | 投与時間  | 投与日(1クール)     |
|          | 標準値                 | 上限値     |      |       |               |
| メソトレキセート | 30mg/m <sup>2</sup> |         | div  | 4hr   | day1, 15, 22  |
| エクザール    | 3mg/m <sup>2</sup>  |         | div  | 30min | day 2, 15, 22 |
| シスプラチン   | 70mg/m <sup>2</sup> |         | div  | 2h    | day 2         |
| ドキソルビシン  | 30mg/m <sup>2</sup> |         | div  | 30min | day 2         |

| M-VAC(ネダプラチン)療法 |                      | 1コースの日数 |      | 28日   |               |
|-----------------|----------------------|---------|------|-------|---------------|
| 抗癌剤名            | 1回投与量                |         | 投与経路 | 投与時間  | 投与日(1クール)     |
|                 | 標準値                  | 上限値     |      |       |               |
| メソトレキセート        | 30mg/m <sup>2</sup>  |         | div  | 4hr   | day1, 15, 22  |
| エクザール           | 3mg/m <sup>2</sup>   |         | div  | 30min | day 2, 15, 22 |
| アクプラ            | 100mg/m <sup>2</sup> |         | div  | 2h    | day 2         |
| ドキソルビシン         | 30mg/m <sup>2</sup>  |         | div  | 30min | day 2         |

| 【泌】TC(PTX+CBDCA)療法 |                      | 1コースの日数 |      | 21   |           |
|--------------------|----------------------|---------|------|------|-----------|
| 抗癌剤名               | 1回投与量                |         | 投与経路 | 投与時間 | 投与日(1クール) |
|                    | 標準値                  | 上限値     |      |      |           |
| パクリタキセル            | 175mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 3時間  | day1      |
| カルボプラチン            | AUC=4                |         | 点滴静注 | 2時間  | day1      |

| 【泌】TP(PTX+CDDP)療法 |                      | 1コースの日数 |      | 21日  |           |
|-------------------|----------------------|---------|------|------|-----------|
| 抗癌剤名              | 1回投与量                |         | 投与経路 | 投与時間 | 投与日(1クール) |
|                   | 標準値                  | 上限値     |      |      |           |
| パクリタキセル           | 175mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 3時間  | day1      |
| シスプラチン            | 70mg/m <sup>2</sup>  |         | 点滴静注 | 2時間  | day2      |

| TGN療法   |                       | 1コースの日数 |      | 21日  |           |
|---------|-----------------------|---------|------|------|-----------|
| 抗癌剤名    | 1回投与量                 |         | 投与経路 | 投与時間 | 投与日(1クール) |
|         | 標準値                   | 上限値     |      |      |           |
| パクリタキセル | 210mg/m <sup>2</sup>  |         | 点滴静注 | 3時間  | day1      |
| ゲムシタビン  | 1000mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 30分  | day1、8    |
| アクプラ    | 100mg/m <sup>2</sup>  |         | 点滴静注 | 2時間  | day2      |

| トリーセル療法療法 |           | 1コースの日数 |      |          |           |
|-----------|-----------|---------|------|----------|-----------|
| 抗癌剤名      | 1回投与量     |         | 投与経路 | 投与時間     | 投与日(1クール) |
|           | 標準値       | 上限値     |      |          |           |
| トリーセル     | 25mg/body |         | 点滴静注 | 30-60min | day1      |

| オブジーボ療法 |                      | 1コースの日数 |      | 14日又は28日 |      |
|---------|----------------------|---------|------|----------|------|
| 薬剤名     | 1回投与量                |         | 投与経路 | 投与時間     | 投与日  |
|         | 標準値                  | 上限値     |      |          |      |
| オブジーボ   | 240mg/日又は<br>480mg/日 |         | 点滴静注 | 30分      | day1 |

| ヤーボイ+オブジーボ療法        |                      | 1コースの日数 |      | 上記参照 |      |
|---------------------|----------------------|---------|------|------|------|
| 薬剤名                 | 1回投与量                |         | 投与経路 | 投与時間 | 投与日  |
|                     | 標準値                  | 上限値     |      |      |      |
| 【 1~4コース 】          |                      |         |      |      |      |
| オブジーボ               | 240mg/日              |         | 点滴静注 | 30分  | day1 |
| ヤーボイ                | 1mg/kg               |         | 点滴静注 | 30分  | day1 |
| 1コースの日数: 21日 4コースのみ |                      |         |      |      |      |
| 【 5コース~ 】           |                      |         |      |      |      |
| オブジーボ               | 240mg/日又は<br>480mg/日 |         | 点滴静注 | 30分  | day1 |
| 1コースの日数: 14日又は28日   |                      |         |      |      |      |

| キイトルーダ療法療法 |                            | 1コースの日数 |      | 21日又は42日 |      |
|------------|----------------------------|---------|------|----------|------|
| 薬剤名        | 1回投与量                      |         | 投与経路 | 投与時間     | 投与日  |
|            | 標準値                        | 上限値     |      |          |      |
| キイトルーダ     | 200mg/body又は<br>420mg/body |         | 点滴静注 | 30分      | day1 |

| BEP療法  |                      | 1コースの日数 |      | 21日   |            |
|--------|----------------------|---------|------|-------|------------|
| 抗癌剤名   | 1回投与量                |         | 投与経路 | 投与時間  | 投与日(1クール)  |
|        | 標準値                  | 上限値     |      |       |            |
| プレオ    | 30mg/body            |         | 点滴静注 | 30min | day1、 8、15 |
| ペプシド   | 100mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 3hr   | day1~5     |
| シスプラチン | 20mg/m <sup>2</sup>  |         | 点滴静注 | 2hr   | day1~5     |

| TIN療法   |                      | 1コースの日数 |      | 21日   |                  |
|---------|----------------------|---------|------|-------|------------------|
| 抗癌剤名    | 1回投与量                |         | 投与経路 | 投与時間  | 投与日(1クール)        |
|         | 標準値                  | 上限値     |      |       |                  |
| パクリタキセル | 200mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 3時間   | day1             |
| アクプラ    | 100mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 2時間   | day2             |
| イホマイド   | 1.2g/m <sup>2</sup>  | 2g      | 点滴静注 | 1.5時間 | day2, 3, 4, 5, 6 |

| VIP療法  |                     | 1コースの日数 |      | 21日  |           |
|--------|---------------------|---------|------|------|-----------|
| 抗癌剤名   | 1回投与量               |         | 投与経路 | 投与時間 | 投与日(1クール) |
|        | 標準値                 | 上限値     |      |      |           |
| シスプラチン | 20mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 2時間  | d1-5      |
| ペプシド   | 75mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 3時間  | d1-5      |
| イホマイド  | 1.2g/m <sup>2</sup> | 2g      | 点滴静注 | 90分  | d1-5      |

| CVD療法  |                      | 1コースの日数  |      | 21日  |        |
|--------|----------------------|----------|------|------|--------|
| 薬剤名    | 1回投与量                |          | 投与経路 | 投与時間 | 投与日    |
|        | 標準値                  | 上限値      |      |      |        |
| ダカルバジン | 600mg/m <sup>2</sup> |          | 点滴静注 |      | day1,2 |
| オンコビン  | 1.4mg/m <sup>2</sup> | 2mg/body | 点滴静注 |      | day1   |
| エンドキサン | 750mg/m <sup>2</sup> |          | 点滴静注 |      | day1   |

| GDC療法  |                      | 1コースの日数 |      | 21日  |        |
|--------|----------------------|---------|------|------|--------|
| 薬剤名    | 1回投与量                |         | 投与経路 | 投与時間 | 投与日    |
|        | 標準値                  | 上限値     |      |      |        |
| ゲムシタビン | 800mg/m <sup>2</sup> |         |      | 30分  | day1,8 |
| ドセタキセル | 35mg/m <sup>2</sup>  |         |      | 1時間  | day1,8 |
| シスプラチン | 35mg/m <sup>2</sup>  |         |      | 1時間  | day1,8 |

| IrN療法(イリノテカン+ネダプラチン) |                      | 1コースの日数              |      | 28日  |           |
|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|-----------|
| 抗癌剤名                 | 1回投与量                |                      | 投与経路 | 投与時間 | 投与日(1クール) |
|                      | 標準値                  | 上限値                  |      |      |           |
| イリノテカン               | 200mg/m <sup>2</sup> | 300mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 3時間  | day1      |
| アクプラ                 | 100mg/m <sup>2</sup> |                      | 点滴静注 | 2時間  | day1      |

| TGP療法   |                       | 1コースの日数 |      | 21日  |                  |
|---------|-----------------------|---------|------|------|------------------|
| 抗癌剤名    | 1回投与量                 |         | 投与経路 | 投与時間 | 投与日(1クール)        |
|         | 標準値                   | 上限値     |      |      |                  |
| パクリタキセル | 210mg/m <sup>2</sup>  |         | 点滴静注 | 3時間  | day1             |
| ゲムシタビン  | 1000mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 30分  | day1, 8          |
| シスプラチン  | 20mg/m <sup>2</sup>   |         | 点滴静注 | 2時間  | day2, 3, 4, 5, 6 |

| TIP療法   |                      | 1コースの日数 |      |      |           |
|---------|----------------------|---------|------|------|-----------|
| 抗癌剤名    | 1回投与量                |         | 投与経路 | 投与時間 | 投与日(1クール) |
|         | 標準値                  | 上限値     |      |      |           |
| パクリタキセル | 175mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 3時間  | day1      |
| イホマイド   | 1.2g/m <sup>2</sup>  |         | 点滴静注 | 2時間  | day1-3    |
| シスプラチン  | 25mg/m <sup>2</sup>  |         | 点滴静注 | 2時間  | day1-3    |

| キイトルーダ+インライタ |            | 1コースの日数 |      | 21日又は42日 |            |
|--------------|------------|---------|------|----------|------------|
| 抗癌剤名         | 1回投与量      |         | 投与経路 | 投与時間     | 投与日(1クール)  |
|              | 標準値        | 上限値     |      |          |            |
| 【3週ごと】キイトルーダ | 200mg/Body |         | 点滴静注 | 30分      | day1 21日ごと |
| 【6週ごと】キイトルーダ | 400mg/Body |         | 点滴静注 | 30分      | day1 42日ごと |
| インライタ        | 10mg/分2    |         | 経口   |          | 連日         |

| キイトルーダ+レンパチニブ |            | 1コースの日数 |      | 21日又は42日 |            |
|---------------|------------|---------|------|----------|------------|
| 抗癌剤名          | 1回投与量      |         | 投与経路 | 投与時間     | 投与日(1クール)  |
|               | 標準値        | 上限値     |      |          |            |
| 【3週ごと】キイトルーダ  | 200mg/Body |         | 点滴静注 | 30分      | day1 21日ごと |
| 【6週ごと】キイトルーダ  | 400mg/Body |         | 点滴静注 | 30分      | day1 42日ごと |
| レンパチニブ        | 20mg/分1    |         | 経口   |          | 連日         |

| (腎)アベルマブ+アキシチニブ |         | 1コースの日数 |      | 14日  |           |
|-----------------|---------|---------|------|------|-----------|
| 抗癌剤名            | 1回投与量   |         | 投与経路 | 投与時間 | 投与日(1クール) |
|                 | 標準値     | 上限値     |      |      |           |
| アベルマブ(ハベンチオ)    | 10mg/kg |         | 点滴静注 | 60分  | day1      |
| インライタ           | 5mg×2   |         | 経口   |      | 連日        |

| アベルマブ維持療法    |         | 1コースの日数 |      | 14日  |           |
|--------------|---------|---------|------|------|-----------|
| 抗癌剤名         | 1回投与量   |         | 投与経路 | 投与時間 | 投与日(1クール) |
|              | 標準値     | 上限値     |      |      |           |
| アベルマブ(ハベンチオ) | 10mg/kg |         | 点滴静注 | 60分  | day1      |

| GEM+PTX療法 |                       | 1コースの日数 |      | 21~28日 |           |
|-----------|-----------------------|---------|------|--------|-----------|
| 抗癌剤名      | 1回投与量                 |         | 投与経路 | 投与時間   | 投与日(1クール) |
|           | 標準値                   | 上限値     |      |        |           |
| パクリタキセル   | 200mg/m <sup>2</sup>  |         | 点滴静注 | 3時間    | day1      |
| ゲムシタビン    | 1000mg/m <sup>2</sup> |         | 点滴静注 | 30分    | day1、8、15 |

| パドセブ療法             |           | 1コースの日数    |      | 28日  |           |
|--------------------|-----------|------------|------|------|-----------|
| 抗癌剤名               | 1回投与量     |            | 投与経路 | 投与時間 | 投与日(1クール) |
|                    | 標準値       | 上限値        |      |      |           |
| パドセブ(エンホルツマブ ヘトチン) | 1.25mg/kg | 125mg/body | 点滴静注 | 30分  | day1、8、15 |