

泌尿器がんレジメン	* 患者さんの状態に合わせて投与量やスケジュールが変更になることがあります。				
ドセタキセル療法	1コースの日数		21日（添書）～28日		
	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日（1クール）
	標準値	上限値			
ドセタキセル	70mg/m2	75mg/m2（添書）	点滴静注	1.5時間 （添書：1時間以上）	day1

ジェブダナ（カバジタキセル）療法	1コースの日数		21日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
ジェブダナ	25mg/m2		点滴静注	1時間	day1
〔プレドニン〕	10mgを分2（朝昼）		内服		day1～21（連日）

キイトルーダ+パドセブ療法	1コースの日数		21日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
キイトルーダ	200mg/Body		点滴静注	30分	day1
パドセブ（エンホルツマフ® ベトチン）	1.25mg/kg	125mg/body	点滴静注	30分	day1,8

GC（GEM＋CBDCA）療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日（1クール）
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	800mg/m2		点滴静注	30分	day1,8,15
カルボプラチン	AUC＝4		点滴静注	3時間	day2

【1コース28日】GC（GEM＋CDDP）療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日（1クール）
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	1000mg/m2		点滴静注	30分	day1 ,8,15
シスプラチン	70mg/m2		点滴静注	2時間	day 2

【1コース21日】GC（GEM＋CDDP）療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日（1クール）
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	1000mg/m2		点滴静注	30分	day1 ,8
シスプラチン	70mg/m2		点滴静注	2時間	day 2

GN（GEM＋N）療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日（1クール）
	標準値	上限値			
ジェムザール	1000mg/m2		点滴静注	30分	day1 ,8,15
アクプラ	100mg/m2		点滴静注	2時間	day 2

M－VAC療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
メソトレキセート	30mg/m ²		div	4hr	day1、 15、22
エクザール	3mg/m ²		div	30min	day 2、15、22
シスプラチン	70mg/m ²		div	2h	day 2
ドキソルビシン	30mg/m ²		div	30min	day 2

M-VAC (ネダプラチン)療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
メソトレキセート	30mg/m ²		div	4hr	day1、 15、22
エクザール	3mg/m ²		div	30min	day 2、15、22
アクプラ	100mg/m ²		div	2h	day 2
ドキソルビシン	30mg/m ²		div	30min	day 2

アベルマブ維持療法	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アベルマブ(ハベンチオ)	10mg/kg		点滴静注	60分	day1

キイトルーダ療法	1コースの日数		21日又は42日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
【3週ごと】キイトルーダ	200mg/Body		点滴静注	30分	day1 21日ごと
【6週ごと】キイトルーダ	400mg/Body		点滴静注	30分	day1 42日ごと

パドセブ療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パドセブ(エンホルツマブ ヘトチン)	1.25mg/kg	125mg/body	点滴静注	30分	day1、8、15

【泌】TC(PTX＋CBDCA)療法	1コースの日数		21		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	175mg/m2		点滴静注	3時間	day1
カルボプラチン	AUC＝4		点滴静注	2時間	day1

【泌】TP(PTX＋CDDP)療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	175mg/m2		点滴静注	3時間	day1
シスプラチン	70mg/m2		点滴静注	2時間	day2

TGN療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	210mg/m2		点滴静注	3時間	day1
ゲムシタピン	1000mg/m2		点滴静注	30分	day1、8
アクプラ	100mg/m2		点滴静注	2時間	day2

トーリセル療法療法	1コースの日数				
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
トーリセル	25mg/body		点滴静注	30-60min	day1

オブジーボ療法	1コースの日数		14日又は28日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
オブジーボ	240mg/日又は 480mg/日		点滴静注	30分	day1

術後補助(尿路上皮)オブジーボ療法	1コースの日数		14日又は28日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
オブジーボ	240mg/日又は 480mg/日		点滴静注	30分	day1

ヤーボイ+オブジーボ療法	1コースの日数		上記参照		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
【 1～4コース 】					
オブジーボ	240mg/日		点滴静注	30分	day1
ヤーボイ	1mg/kg		点滴静注	30分	day1
1コースの日数:21日 4コースのみ					
【 5コース～ 】					
オブジーボ	240mg/日又は 480mg/日		点滴静注	30分	day1
1コースの日数:14日又は28日					

BEP療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ブレオ	30mg/body		点滴静注	30min	day1、 8、15
ベブシド	100mg/m2		点滴静注	3hr	day1～5
シスプラチン	20mg/m2		点滴静注	2hr	day1～5

TIN療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	200mg/m2		点滴静注	3時間	day1
アクプラ	100mg/m2		点滴静注	2時間	day2
イホマイド	1.2g/m2	2g	点滴静注	1.5時間	day2, 3, 4, 5, 6

VIP療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
シスプラチン	20mg/m2		点滴静注	2時間	d1-5
ベブシド	75mg/m2		点滴静注	3時間	d1-5
イホマイド	1.2g/m2	2g	点滴静注	90分	d1-5

CVD療法	1コースの日数		21日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
ダカルバジン	600mg/m2		点滴静注		day1,2
オンコビン	1.4mg/m2	2mg/body	点滴静注		day1
エンドキサン	750mg/m2		点滴静注		day1

GDC療法	1コースの日数		21日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	800mg/m ²			30分	day1,8
ドセタキセル	35mg/m ²			1時間	day1,8
シスプラチン	35mg/m ²			1時間	day1,8

IrN療法（イリノテカン+ネダプラチン）	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日（1クール）
	標準値	上限値			
イリノテカン	200mg/m2	300mg/m2	点滴静注	3時間	day1
アクプラ	100mg/m2		点滴静注	2時間	day1

TGP療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日（1クール）
	標準値	上限値			
パクリタキセル	210mg/m2		点滴静注	3時間	day1
ゲムシタビン	1000mg/m2		点滴静注	30分	day1、8
シスプラチン	20mg/m2		点滴静注	2時間	day2、3、4、5、6

TIP療法	1コースの日数				
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日（1クール）
	標準値	上限値			
パクリタキセル	175mg/m2		点滴静注	3時間	day1
イホマイド	1.2g/m2		点滴静注	2時間	day1-3
シスプラチン	25mg/m2		点滴静注	2時間	day1-3

GEM+PTX療法	1コースの日数		21～28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日（1クール）
	標準値	上限値			
パクリタキセル	200mg/m2		点滴静注	3時間	day1
ゲムシタビン	1000mg/m2		点滴静注	30分	day1、8、15

(腎)術後キイトルーダ療法	1コースの日数		21日又は42日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
【3週ごと】キイトルーダ	200mg/Body		点滴静注	30分	day1 21日ごと
【6週ごと】キイトルーダ	400mg/Body		点滴静注	30分	day1 42日ごと

キイトルーダ+インライタ	1コースの日数		21日又は42日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【3週ごと】キイトルーダ	200mg/Body		点滴静注	30分	day1 21日ごと
【6週ごと】キイトルーダ	400mg/Body		点滴静注	30分	day1 42日ごと
インライタ	10mg/分2		経口		連日

キイトルーダ+レンパチニブ	1コースの日数		21日又は42日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【3週ごと】キイトルーダ	200mg/Body		点滴静注	30分	day1 21日ごと
【6週ごと】キイトルーダ	400mg/Body		点滴静注	30分	day1 42日ごと
レンパチニブ	20mg/分1		経口		連日

(腎)アベルマブ+アキシチニブ	1コースの日数		14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アベルマブ(ハペンチオ)	10mg/kg		点滴静注	60分	day1
インライタ	5mg×2		経口		連日

オブジーボ+カボザンチニブ療法	1コースの日数		14日又は28日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
オブジーボ	240mg/日又は 480mg/日		点滴静注	30分	day1
カボザンチニブ	40mg/日(空腹時)		経口		連日