

**肝・胆・膵がん**

\* 患者さんの状態に合わせて投与量やスケジュールが変更になることがあります。

GEM単独		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ゲムシタビン		1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	必ず30min	day1,8,15

S-1+GEM療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	30min	day1、8
S-1	60mg/m <sup>2</sup>		内服		day1～14

GS[GEM+S1]療法〔胆道がん〕		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	30min	day1、8
S-1	60mg/m <sup>2</sup>		内服		day1～14

GEM+CDDP療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	30min	day 1,8
シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	1hr	day 1,8

FOLFIRINOX療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	2時間	day1
イリノテカン	180mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	90分	day1
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	2時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>		急速静注		day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	46時間	day1-3(3日間46時間で合計2400mg/m <sup>2</sup> )

modified FOLFIRINOX療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	2時間	day1
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	90分	day1
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	2時間	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	46時間	day1-3(3日間46時間で合計2400mg/m <sup>2</sup> )

アブラキサン+ゲムシタビン療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
アブラキサン	125mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	30min	day1,8,15
ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	30min	day1,8,15

nal-IRI+5FU/LV療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
オニバイド	70mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	90分	day1
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	2時間	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	46時間	day1

テセントリク+アバスチン療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
テセントリク	1200mg/body		点滴静注	60分	day1
アバスチン	15mg/kg		点滴静注	90分	day1

ラムシルマブ単独療法		1コースの日数		14日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
サイラムザ	8mg/kg		点滴静注	60分	day1

### 食道がん

CDDP単独【15/m <sup>2</sup> :A法】療法		1コースの日数		19日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
シスプラチン					
シスプラチン【A法】食道癌	15mg/m <sup>2</sup>	20mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2hr	day1-5。その後14日間休薬

CDDP単独【50mg/m <sup>2</sup> :B法】療法		1コースの日数		22日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
シスプラチン					
シスプラチン【B法】食道癌	50mg/m <sup>2</sup>	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2hr	day1。21日間休薬

FP療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup>		持続静注	24hr	day1~5

ドセタキセル療法		1コースの日数		21~28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドセタキセル		70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1hr	day1

Weekly Paclitaxel療法		1コースの日数		49日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	1hr	day1,8,15,22,29,36