

肝・胆・膵がん

*** 患者さんの状態に合わせて投与量やスケジュールが変更になることがあります。**

GEM単独		1コースの日数	28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ゲムシタビン		1000mg/m ²	点滴静注	必ず30min	day1,8,15

S-1 + GEM療法		1コースの日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	1000mg/m ²		点滴静注	30min	day1、8
S-1	60mg/m ²		内服		day1～14

GS[GEM+S1]療法〔胆道がん〕		1コースの日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	1000mg/m ²		点滴静注	30min	day1、8
S-1	60mg/m ²		内服		day1～14

GEM+ODDP療法		1コースの日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ゲムシタビン	1000mg/m ²		点滴静注	30min	day 1,8
シスプラチン	25mg/m ²		点滴静注	1hr	day 1,8

FOLFIRINOX療法		1コースの日数	14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
オキサリプラチン	85mg/m ²		点滴静注	2時間	day1
イリノテカン	180mg/m ²		点滴静注	90分	day1
レボホリナート	200mg/m ²		点滴静注	2時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m ²		急速静注		day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴静注	46時間	day1-3(3日間46時間で合計2400mg/m ²)

modified FOLFIRINOX療法		1コースの日数	14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
オキサリプラチン	85mg/m ²		点滴静注	2時間	day1
イリノテカン	150mg/m ²		点滴静注	90分	day1
レボホリナート	200mg/m ²		点滴静注	2時間	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴静注	46時間	day1-3(3日間46時間で合計2400mg/m ²)

アブラキサン+ゲムシタビン療法		1コースの日数	28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
アブラキサン	125mg/m ²		点滴静注	30min	day1,8,15
ゲムシタビン	1000mg/m ²		点滴静注	30min	day1,8,15

nal-IRI+5FU/LV療法		1コースの日数	14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
オニバイド	70mg/m ²		点滴静注	90分	day1
レボホリナート	200mg/m ²		点滴静注	2時間	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴静注	46時間	day1

テセントリク+アバスチン療法		1コースの日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
テセントリク	1200mg/body		点滴静注	60分	day1
アバスチン	15mg/kg		点滴静注	30～90分	day1

イミフィンジ+イジウド療法		1コースの日数	28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イミフィンジ	1500mg/body		点滴静注	60分	day1
イジウド	300mg/body		点滴静注	60分	day1(初回のみ)
【2回目以降】イミフィンジ	1500mg/body		点滴静注	60分	day1

ラムシルマブ単独療法		1コースの日数	14日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
サイラムザ	8mg/kg		点滴静注	60分	day1

(胆)デュルバルマブ+GC療法		1コースの日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イミフィンジ	1500mg/body		点滴静注	60分	day1
ゲムシタビン	1000mg/m2		点滴静注	30min	day 1,8
シスプラチン	25mg/m2		点滴静注	1hr	day 1,8

(胆)デュルバルマブ維持療法		1コースの日数	28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イミフィンジ	1500mg/body		点滴静注	60分	day1

(胆)キイトルーダ+GC療法		1コースの日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キイトルーダ	200mg/body		点滴静注	30分	day1
ゲムシタビン	1000mg/m2		点滴静注	30分	day 1,8
シスプラチン	25mg/m2		点滴静注	1hr	day 1,8

(胆)キイトルーダ+G維持療法		1コースの日数	21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キイトルーダ	200mg/body		点滴静注	30分	day1
ゲムシタビン	1000mg/m2		点滴静注	30分	day 1,8

食道がん					
CDDP単独【15/m2:A法】療法		1コースの日数	19日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
シスプラチン					
シスプラチン【A法】食道癌	15mg/m2	20mg/m2	点滴静注	2hr	day1-5。その後14日間休薬

CDDP単独【50mg/m2:B法】療法		1コースの日数	22日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
シスプラチン					
シスプラチン【B法】食道癌	50mg/m2	70mg/m2	点滴静注	2hr	day1。21日間休薬

FP療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
シスプラチン	80mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	800mg/m ²		持続静注	24hr	day1～5

ニボルマブ+FP療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
シスプラチン	80mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	800mg/m ²		持続静注	24hr	day1～5
オブジーボ	480mg/body		点滴静注	30min	day1

ドセタキセル療法	1コースの日数		21～28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドセタキセル		70mg/m2	点滴静注	1hr	day1

Weekly Paclitaxel療法	1コースの日数		49日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
パクリタキセル	100mg/m2		点滴静注	1hr	day1,8,15,22,29,36

(食道)DCF療法	1コースの日数		21日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
シスプラチン	70mg/m ²		点滴静注	2hr	day1
フルオロウラシル	750mg/m ²		持続静注	24hr	day1～5
ドセタキセル	70mg/m2		点滴静注	1hr	day1

(食道)UDON療法	1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ネダブラチン	72mg/m ²		点滴静注	1hr	day1
フルオロウラシル	640mg/m ²		持続静注	24hr	day1～5
ドセタキセル	28mg/m2		点滴静注	1hr	day1,15