

血液がんレジメン

* 患者さんの状態に合わせて投与量やスケジュールが変更になることがあります

■ 急性骨髄性白血病 ■

JALSG AML201 療法		1コースの日数		-	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
イダマイシン	12mg/m2		点滴静注	30min	day1~3
キロサイド	100mg/m2/day		持続点滴	24hr	day1~~7

JALSG AML201療法		1コースの日数		-	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ダウノマイシン	50mg/m2		点滴静注	30min	day1~5
キロサイド	100mg/m2		持続点滴	24hr	day1~~7

JALSG AML201 地固め1:C1:MA療法		1コースの日数		-	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キロサイド	200mg/m2		持続点滴	24hr	day1~5
ノバントロン	7mg/m2		点滴静注	30min	day1~3

JALSG AML201 地固め2:C2:DA療法		1コースの日数		-	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キロサイド	200mg/m2		持続点滴	24hr	day1~~5
ダウノマイシン	50mg/m2		点滴静注	30min	day1~3

JALSG AML201 地固め3:C3:AA療法		1コースの日数		-	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キロサイド	200mg/m2		持続点滴	24hr	day1~5
アクラシノン	20mg/m2		点滴静注	30min	day1~5

JALSG AML201 地固め4:C4:A-tripleV療法		1コースの日数		-	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キロサイド	200mg/m2		持続点滴	24hr	day1~5
ペプシド	100mg/m2		点滴静注	1hr	day1~5
オンコビン	0.8mg/m2		静注		day8
フィルデシン	2mg/m2		静注		day10

HD-AraC療法		1コースの日数		-	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
キロサイド	2000mg/m2/回		点滴静注	必ず3hr	day1~5 :12時間ごと計10回
	60歳以上は1500mg/m2/回も考慮				

高齢者AML 寛解導入療法		1コースの日数		-		投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間												
	標準値	上限値			day1	2	3	4	5	6	7	8				
キロサイド	80mg/m2/日		持続点滴	24hr	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				
ダウノマイシン	40mg/m2		点滴静注	30min	↓	↓	↓									
	└ 70歳以上は30mg/m2															

高齢者AML地固め1:C1療法		1コースの日数		-		投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間												
	標準値	上限値			day1	2	3	4	5							
キロサイド	80mg/m2/日		持続点滴	24hr	↓	↓	↓	↓	↓							
ノバントロン	7mg/m2		点滴静注	30min	↓	↓	↓									
	└ 70歳以上は5mg/m2															

高齢者AML地固め2:C2療法		1コースの日数		-		投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間												
	標準値	上限値			day1	2	3	4	5							
キロサイド	80mg/m2		持続点滴	24hr	↓	↓	↓	↓	↓							
ダウノマイシン	30mg/m2		点滴静注	30min	↓	↓										
	└ 70歳以上は25mg/m2															
ペプシド	100mg/m2		点滴静注	1hr	↓	↓	↓									
	└ 70歳以上は75mg/m2															

高齢者AML地固め3:C3療法		1コースの日数		-		投与日(1クール)							
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間									
	標準値	上限値			day1	2	3	4	5				

キロサイド	80mg/m ² /日		持続点滴	24hr	↓	↓	↓	↓	↓								
アクラシノン	14mg/m ²		点滴静注	30min	↓	↓	↓	↓	↓								
		└ 70歳以上は10mg/m ² へ減量															

JALSG APL204 地固め療法【C2】療法		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		標準値			上限値	day1	2	3	4	5					
	標準値	上限値														
ダウノマイシン	50mg/m2				点滴静注	30min	↓	↓	↓							
キロサイド	200mg/m2/day				持続点滴	24hr	↓	↓	↓	↓	↓					

JALSG APL204 地固め療法【C3】療法		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		標準値			上限値	day1	2	3	4	5					
	標準値	上限値														
イダマイシン	12mg/m2				点滴静注	30min	day1~3									
キロサイド	140mg/m2/day				持続点滴	24hr	day1~5									

ALSG APL212G 地固め療法		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		標準値			上限値	day1	2	3	4	5					
	標準値	上限値														
トリセノックス	0.15mg/kg				点滴静注	2h	day 1,2,3,4,5									

■ JALSG APL 212[G] ■

JALSG APL212[G]寛解導入法【D群:A】		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		標準値			上限値	day1	day2	day3							
	標準値	上限値														
イダマイシン	8mg/m2				点滴静注	30min	↓	↓	↓							

JALSG APL212[G] 地固め療法【C1】		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		標準値			上限値	day1	2	3	4	5					
	標準値	上限値														
トリセノックス	0.15mg/kg				点滴静注	2h	day 1,2,3,4,5									

JALSG APL212寛解導入法【B群】		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		標準値			上限値	day1	2	3	4	5					
	標準値	上限値														
ベサノイド	45mg/m2/day				経口	分3	day1~連日									
イダマイシン	12mg/m2				点滴静注	30min	↓	↓								
キロサイド	100mg/m2/day				持続静注	24hr	↓	↓	↓	↓	↓					

JALSG APL212寛解導入法【C群】		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		標準値			上限値	day1	2	3	4	5	6	7			
	標準値	上限値														
ベサノイド	45mg/m2/day				経口	分3	day1~連日									
イダマイシン	12mg/m2				点滴静注	30min	↓	↓	↓							
キロサイド	100mg/m2/day				持続静注	24hr	↓	↓	↓	↓	↓	↓				

JALSG APL212寛解導入法【D群:A】		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		標準値			上限値	day1	2	3	4	5	6	7			
	標準値	上限値														
イダマイシン	12mg/m2				点滴静注	30min	↓	↓	↓							
キロサイド	100mg/m2/day				持続静注	24hr	↓	↓	↓	↓	↓	↓				

JALSG APL212寛解導入法【D群:B】		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		標準値			上限値	day1	2	3	4	5	6	7			
	標準値	上限値														
イダマイシン	12mg/m2				点滴静注	30min	↓									
キロサイド	100mg/m2/day				持続静注	24hr	↓	↓								

JALSG APL212寛解導入法【D群:C】		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		標準値			上限値	day1									
	標準値	上限値														
イダマイシン	12mg/m2				点滴静注	30min	↓									

JALSG APL212 地固め療法【C1】		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		標準値			上限値	day1	2	3	4	5					
	標準値	上限値														
トリセノックス	0.15mg/kg				点滴静注	2h	day 1,2,3,4,5									

JALSG APL212 地固め療法【C2】		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)										
抗癌剤名	1回投与量		標準値			上限値	day1	2	3	4	5					
	標準値	上限値														
キロサイド	200mg/m2				持続点滴	24hr	day1~5									
ダウノマイシン	50mg/m2				点滴静注	30min	day1~3									

JSCT APL2021寛解導入法【低リスク】		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
抗癌剤名	1回投与量					
		標準値	上限値			
ベサノイド(ATRA)	45mg/m ² /day		経口	分2~3	day1~連日 寛解まで	
トリセノックス(ATO)	0.15mg/kg		点滴静注	2h	PML/RARA検出後開始→連日→開始から60日目	
プレドニン	0.5mg/kg		経口		day1~14。15以降漸減中止	

JSCT APL2021寛解導入法【高リスク】		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
抗癌剤名	1回投与量					
		標準値	上限値			
イダマイシン	12mg/m ²		点滴静注	30min	day2,4,6,8	
	↑65歳以上では8mg/m ² への減量も考慮					
ベサノイド(ATRA)	45mg/m ² /day		経口	分2~3	day1~連日 寛解まで	
トリセノックス(ATO)	0.15mg/kg		点滴静注	2h	PML/RARA検出後開始→連日→開始から60日目	
プレドニン	0.5mg/kg		経口		day1~14。15以降漸減中止	

■ 急性リンパ性白血病 ■

JALSG ALL202 寛解導入法		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
抗癌剤名	1回投与量					
		標準値	上限値			
【25歳以上60歳未満】						
エンドキサン	1200mg/m ²		点滴静注	3hr	day1	
ダウノマイシン	60mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,2,3	
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg	静注	~30min	day1,8,15,22	
ロイナーゼ	3000U/m ²		点滴静注	2hr	day 9,11,13,16,18,20	
プレドニン	60mg/m ² /day		経口		day1~14、その後7日で漸減	
【60歳以上】						
エンドキサン	800mg/m ²		点滴静注	3hr	day1	
ダウノマイシン	30mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,2,3	
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg	静注	~30min	day1,8,15,22	
ロイナーゼ	3000U/m ²		点滴静注	2hr	day9,11,13,16,18,20	
プレドニン	60mg/m ² /day		経口		day1~7、その後7日で漸減	

JALSG ALL202-O【地固め療法:C1】療法		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
抗癌剤名	1回投与量					
		標準値	上限値			
【25歳以上60歳未満】						
キロサイド	2g/m ² /回		点滴静注	3hr	day1,2,3	12hrごと計6回
ペプシド	100mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,2,3	
デキサート	40mg/body		点滴静注	1hr	day1,2,3	
髄注:[MTX15mg+デキサート4mg] day1						
【60歳以上】						
キロサイド	1g/m ² /回		点滴静注	3hr	day1,2,3	12hrごと計6回
ペプシド	100mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,2,3	
デキサート	40mg/body		点滴静注	1hr	day1,2,3	

JALSG ALL202-O【地固め療法:C2A】療法		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
抗癌剤名	1回投与量					
		標準値	上限値			
【25歳以上50歳未満】						
メソトレキセート	3g/m ²		点滴静注	24h	day1,15	
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg/body	点滴静注		day1,15	
ロイケリン	25mg/m ²		経口		day1-21 (分1:眠前)	
メソトレキセート	15mg/body		髄注		day1,15(MTX開始2時間後から終了までに)	
デキサート	4mg/body		髄注		day1,15(MTX開始2時間後から終了までに)	
【50歳以上】						
メソトレキセート	1.5g/m ²		点滴静注	24h	day1,15	
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg/body	点滴静注		day1,15	
ロイケリン	25mg/m ²		経口		day1-21 (分1:眠前)	
メソトレキセート	15mg/body		髄注		day1,15(MTX開始2時間後から終了までに)	
デキサート	4mg/body		髄注		day1,15(MTX開始2時間後から終了までに)	

JALSG ALL202-O【地固め療法:C3】療法		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
抗癌剤名	1回投与量					
		標準値	上限値			
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg/body	点滴静注		day1,8,15	
ドキソルビシン	30mg/m ²		点滴静注	1h	day1,8,15	
デキサート	10mg/m ²		経口		day1~8 ,15~22	
エンドキサン	1g/m ²		点滴静注	3h	day 29	
ロイケリン	60mg/m ²		経口		day 29~42 (分1:眠前)	
キロサイド	75mg/m ²		点滴静注	1h	day 29~33 ,36~40	

JALSG ALL 維持療法202-O

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
ロイケリン散	60mg/m ²		経口(眠前)		day1~28
メソトレキセート錠	20mg/m ²		経口(朝後か眠前)		day1,8,15,22
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg	静注		day1
プレドニン	60mg/m ²		経口		day1~5

JALSG Ph+ALL208変法【寛解導入法】

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
エンドキサン	1200mg/m ²		点滴静注	3hr	day1
	└ 60歳以上は800mg/m ²				
ダウノマイシン	60mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,2,3
	└ 60歳以上は30mg/m ²				
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg	点滴静注	30min	day1,8,15,22
プレドニン	60mg/m ² /day		経口		day1~21。その後漸減
	└ 60歳以上はday1-7。その後漸減				
スプリセル	140mg/body/day		経口		day 8-42

JALSG Ph+ALL208変法【地固め療法C1】

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
メソトレキセート	100mg/m ²		点滴静注	1hr	day1
メソトレキセート	900mg/m ²		点滴静注	23hr	day1
キロサイド	2g/m ² /回		点滴静注	3hr	day2,3 (12時間ごと計4回)
	└ 60歳以上は1g/m ² /回				
ソル・メドロール	50mg/body/回		静注		day1,2,3(12時間ごと計6回)
スプリセル	140mg/body/day		経口		day4-21(22-28は休薬)
MTX15mg+AraC40mg+デキサート4mg			IT		day1

JALSG Ph+ALL208変法【地固め療法C2】

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
エンドキサン	1200mg/m ²		点滴静注	3hr	day1
ダウノマイシン	60mg/m ²		点滴静注	1hr	day1
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg	点滴静注	30min	day1
プレドニン	60mg/m ² /day		経口		day1~7(その後1週間で漸減)
スプリセル	140mg/body/day		経口		day2-21(22-28は休薬)

JALSG Ph+ALL208変法【維持療法】

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg	点滴静注	30min	day1
プレドニン	60mg/m ² /day		経口		day1-5
スプリセル	140mg/日		経口		day1-28

EWALL-PH-01 寛解導入療法

薬剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日
	1回投与量				
	標準値	上限値			
オンコビン	1mg/body		点滴静注	30分	day1,8,15,22
デキサメタゾン	40mg/body		経口		day1,2, 8,9, 15,16, 22,23
	→ 70歳以上 20mg/body		経口		day1,2, 8,9, 15,16, 22,23
スプリセル	140mg/body		経口		day1~42
	→ 70歳以上 100mg/body		経口		day1~42
triple			髄注		day9,16,23

EWALL-PH-01 地固め療法[C1,3,5]

薬剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日
	1回投与量				
	標準値	上限値			
スプリセル	100mg/day		経口		day14~27
メソトレキセート	1000mg/m ²		点滴静注	24h	day1
	↑ 70歳以上は500mg/m ²				
ロイナーゼ	10000mg/m ²				day2
	↑ 70歳以上は5000mg/m ²				
triple			髄注		day1 →→ C1とC3のみ

EWALL-PH-01 地固め療法[C2,4,6]

薬剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日
	1回投与量				
	標準値	上限値			
スプリセル	100mg/day		経口		day14~27
キロサイド	1000mg/m ² /12h毎		点滴静注	2h	day1,2,3 (1日2回×3日→計6回)
	↑ 70歳以上は500mg/m ²				

JALSG Ph+ALL213【先行PSL+寛解導入療法】

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
プレドニン	60mg/m ²		経口		day1-21 その後30mg/m ² *2日、15mg/m ² *2日、5mg/m ² *3日

スプリセル	140mg/日		分1か2		day8-35
髄注:[MTX15mg+デキサート4mg] day22					

JALSG Ph+ALL213【強化地固め療法】		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
抗癌剤名	1回投与量					
	標準値	上限値				
エンドキサン	1200mg/m ²		点滴静注	3hr	day1	
	└ 60歳以上は900mg/m ²					
ダウノマイシン	45mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,2,3	
	└ 60歳以上は30mg/m ²					
オンコピン	1.3mg/m ²	2mg	点滴静注	30min	day1,8,15,22	
プレドニン	60mg/m ² /day		経口		day1~21。その後漸減	
	└ 60歳以上は45mg/m ² /day。その後漸減その後30mg/m ² *2日、15mg/m ² *2日、5mg/m ² *3日					
スプリセル	100mg/body/da		経口		day 4-31	

JALSG Ph+ALL213【地固め療法C1】		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
抗癌剤名	1回投与量					
	標準値	上限値				
メトレキサート	100mg/m ²		点滴静注	1hr	day1	
メトレキサート	900mg/m ²		点滴静注	23hr	day1	
キロサイド	2000mg/m ² /回		点滴静注	3hr	day2,3 (12時間ごと計4回)	
	└ 60歳以上は1000mg/m ² /					
ソル・メドロール	50mg/body/回		点滴静注	30min	day1,2,3 (12時間ごと計6回)	
スプリセル	100mg/body/da		経口		day4~24	
髄注:[MTX15mg+デキサート4mg] day1						

JALSG Ph+ALL213【地固め療法C2】		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
抗癌剤名	1回投与量					
	標準値	上限値				
エンドキサン	1200mg/m ²		点滴静注	3hr	day1	
ダウノマイシン	45mg/m ²		点滴静注	1hr	day1	
オンコピン	1.3mg/m ²	2mg	点滴静注	30min	day1	
プレドニン	60mg/m ² /day		経口		day1~7。その後漸減	
	└ その後漸減30mg/m ² *2日、15mg/m ² *2日、5mg/m ² *3日					
スプリセル	100mg/body/da		経口		day2-22	
髄注:[MTX15mg+デキサート4mg] day1						

■ 骨髄異形成症候群 ■														
ビダーザ療法		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)								
抗癌剤名	1回投与量		投与経路			投与時間	day1	2	3	4	5	6	7	
	標準値	上限値												
ビダーザ	75mg/m ²		皮下投与		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
			もしくは		7日間投与									
			点滴静注	10分以上	*月-金投与、土日休み、月火投与の計:7日間投与もあります。									

■ 悪性リンパ種〔非ホジキン〕 ■

R-CHOP療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1(投与日は様々)
ドキシソルビシン	50mg/m ²		点滴静注		day2
エンドキサン	750mg/m ²		点滴静注		day2
オンコビン	1.4mg/m ²	2mg/body	静注		day2
プレドニン	100mg/body/day		経口		day1~5

R-THP-COP療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【通常量】					
ピノルビン	50mg/m ²		点滴静注		day2
エンドキサン	750mg/m ²		点滴静注		day2
オンコビン	1.4mg/m ²	2mg/body	静注		day2
プレドニン	100mg/body/day		経口		day1~5
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1(投与日は色々です)
【減量】					
ピノルビン	40mg/m ²		点滴静注		day2
エンドキサン	650mg/m ²		点滴静注		day2
オンコビン	1mg/m ²	2mg/body	静注		day2
プレドニン	40mg/m ² /day		経口		day1~5
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1(投与日は色々です)
【減量】					
ピノルビン	30mg/m ²		点滴静注		day2
エンドキサン	500mg/m ²		点滴静注		day2
オンコビン	1mg/m ²	2mg/body	静注		day2
プレドニン	30mg/m ² /day		経口		day1~5
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1(投与日は色々です)

リツキサン療法		1コースの日数		7日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1

ガザイバ+ベンダムスチン療法		1コースの日数		28日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
【1サイクル】					
ガザイバ	1000mg/日		点滴静注	添書通り	day1,8,15
トリアキシン	90mg/m ²		点滴静注	1hr	day2、3
【2サイクル以降】					
ガザイバ	1000mg/日		点滴静注	添書通り	day1
トリアキシン	90mg/m ²		点滴静注	1hr	day1、2

ガザイバ単独【維持療法】		1コースの日数		2ヶ月	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
ガザイバ	1000mg/日		点滴静注	添書通り	day1

VR-CAP療法		1コースの日数		21日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1(投与日は様々)
ドキシソルビシン	50mg/m ²		点滴静注		day2
エンドキサン	750mg/m ²		点滴静注		day2
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day2、5、9、12
プレドニン	100mg/body/day		経口		day1~5

VR-THP-CP療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【通常量】					
ピノルビン	50mg/m ²		点滴静注		day2
エンドキサン	750mg/m ²		点滴静注		day2
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day2、5、9、12
プレドニン	100mg/body/day		経口		day1~5
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1(投与日は色々です)

【減量】					
ピノルビン	40mg/m ²		点滴静注		day2
エンドキサン	650mg/m ²		点滴静注		day2
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day2、5、9、12
プレドニン	40mg/m ² /day		経口		day1~5
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1(投与日は色々です)
【減量】					
ピノルビン	30mg/m ²		点滴静注		day2
エンドキサン	500mg/m ²		点滴静注		day2
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day2、5、9、12
プレドニン	30mg/m ² /day		経口		day1~5
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1(投与日は色々です)

■ サルベージ ■

CHASER 療法

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)						
	1回投与量				1	2	3	4			
	標準値	上限値									
エンドキサン	1200mg/m ²		点滴静注		day2		↓				
キロサイド	2g/m ²		点滴静注		day3,4			↓	↓		
ペプシド	100mg/m ²		点滴静注		day2,3,4		↓	↓	↓		
デキサート	40mg/body		点滴静注		day2,3,4		↓	↓	↓		
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1	↓					

R-DeVIC療法

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)						
	1回投与量				1	2	3	4			
	標準値	上限値									
カルボプラチン	300mg/m ²		点滴静注		day1						
ペプシド	100mg/m ²		点滴静注		day1,2,3						
イホマイド	1500mg/m ²		点滴静注		day1,2,3						
デキサート	40mg/body		静注		day1,2,3						
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1(投与日は様々)						

CPT11+デキサート+VDS療法

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	21日													
	1回投与量				投与日(1クール)													
	標準値	上限値			1	2	3	4	5	-	10	11	12	13	14			
フィルデシン	3mg/body		点滴静注	30min	↓							↓						
イリノテカン	100mg/m ²		点滴静注	150min	↓							(↓)						
デキサート	40mg/body		点滴静注	30min	↓	↓	↓	↓				↓	↓	↓	↓			

HD-VP16療法

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)					
	1回投与量				1	2	3	4		
	標準値	上限値								
ペプシド	500mg/m ²		点滴静注	6~8時間	day1~3					

MEL200療法

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)					
	1回投与量				1	2	3	4		
	標準値	上限値								
アルケラン	100mg/m ²		点滴静注	30min	day-3, -2					
自家末梢血幹細胞移植					day0					

LEED療法

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)					
	1回投与量				1	2	3	4		
	標準値	上限値								
アルケラン	130mg/m ²		点滴静注		day-1					
エンドキサン	60mg/kg		点滴静注		day-4, -3					
ペプシド	500mg/m ²		点滴静注		day-4, -3, -2					
デキサート	40mg/body		点滴静注		day-4, -3, -2, -1					
aut-PBSCT(幹細胞移植)					day0					

R-MVP療法

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	14日間					
	1回投与量				投与日(1クール)					
	標準値	上限値			1	2	3	4		
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書参照	day1					
メソトレキセート	3.5g/m ²		点滴静注	3hr	day2					
オンコピン	1.4mg/m ²	2mg/body	点滴静注	30min	day2					
プロカルバジン	100mg/m ² /日		経口		day1~7【奇数サイクルのみ】					

HD-AraC 地固め療法【2日間】

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	28日					
	1回投与量				投与日(1クール)					
	標準値	上限値			1	2	3	4		
キロサイド	3000mg/m ²	6000mg/日	点滴静注	必ず3hr	day1~2					

GDP療法

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	21日					
	1回投与量				投与日(1クール)					
	標準値	上限値			1	2	3	4		
ゲムシタピン	1000mg/m ²		点滴静注	30min	day1, 8					
シスプラチン	75mg/m ²		点滴静注	60min	day1					
デキサート	40(33)mg		経口		day1,2,3,4,					

GCD(R)療法

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	21日					
	1回投与量				投与日(1クール)					
	標準値	上限値			1	2	3	4		
ゲムシタピン	1000mg/m ²		点滴静注	30分	day1, 8					
カルボプラチン	AUC=5	750mg	点滴静注	1時間	day1					
デキサメタゾン錠	40mg/body		経口		day1~4					

リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day8
-------	----------------------	--	------	--	------

ベンダムスチン単独療法

		1コースの日数	21日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
トレアキシム	120mg/m ²		点滴静注	1hr	day1、2

R-ベンダムスチン療法

		1コースの日数	28日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
【入院】					
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り	day1
トレアキシム	90mg/m ²		点滴静注	1hr	day2、3
【外来】					
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り	day1
トレアキシム	90mg/m ²		点滴静注	1hr	day1、2

R-Hyper CVAD 療法

		1コースの日数	21日間		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
エンドキサン	300mg/m ² /回		点滴静注	3hr	1日2回12時間毎 day1~3 (合計6回)
オンコビン	2mg/body		点滴静注	30min	day4,11
ドキシソルビシン	50mg/m ²		点滴静注	24h	day4
デキサメタゾン	40mg/body		点滴静注	30min	day1~4,day11~14
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り	day11

R-MA療法

		1コースの日数	21日間		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
メトトレキサート	100mg/m ²		点滴静注	1hr	day1
メトトレキサート	900mg/m ²		点滴静注	23hr	day1
キロサイド	2000mg/m ² /回 └ 60歳以上は1000mg/m ² /回		点滴静注	3hr	day2,3 (12時間ごと計4回)
ソル・メドロール	50mg/body/回		静注		day1,2,3(12時間ごと計6回)
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り	day10

DA (dose adjusted)-EPOCH-R療法 1コースの日数 21日

【標準:レベル1】

薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
リツキサン	375mg/m2		点滴静注	添書通り	day1
ペプシド	50mg/m2/day		点滴静注	計96時間	day2~5
ドキソルビシン	10mg/m2/day		点滴静注	計96時間	day2~5
オンコビン	0.4mg/m2/day	* 増量しない	点滴静注	計96時間	day2~5
エンドキサン	750mg/m2/day		点滴静注	60分	day6
プレドニン	60mg/m2/day		経口		day2~6

【レベル-1】

リツキサン	375mg/m2		点滴静注	添書通り	day1
ペプシド	50mg/m2/day		点滴静注	計96時間	day2~5
ドキソルビシン	10mg/m2/day		点滴静注	計96時間	day2~5
オンコビン	0.4mg/m2/day	* 増量しない	点滴静注	計96時間	day2~5
エンドキサン	600mg/m2/day		点滴静注	60分	day6
プレドニン	60mg/m2/day		経口		day2~6

【レベル2】

リツキサン	375mg/m2		点滴静注	添書通り	day1
ペプシド	60mg/m2/day		点滴静注	計96時間	day2~5
ドキソルビシン	12mg/m2/day		点滴静注	計96時間	day2~5
オンコビン	0.4mg/m2/day	* 増量しない	点滴静注	計96時間	day2~5
エンドキサン	900mg/m2/day		点滴静注	60分	day6
プレドニン	60mg/m2/day		経口		day2~6

【レベル3】

リツキサン	375mg/m2		点滴静注	添書通り	day1
ペプシド	72mg/m2/day		点滴静注	計96時間	day2~5
ドキソルビシン	14.4mg/m2/day		点滴静注	計96時間	day2~5
オンコビン	0.4mg/m2/day	* 増量しない	点滴静注	計96時間	day2~5
エンドキサン	1080mg/m2/day		点滴静注	60分	day6
プレドニン	60mg/m2/day		経口		day2~6

【レベル4】

リツキサン	375mg/m2		点滴静注	添書通り	day1
ペプシド	86.4mg/m2/day		点滴静注	計96時間	day2~5
ドキソルビシン	17.3mg/m2/day		点滴静注	計96時間	day2~5
オンコビン	0.4mg/m2/day	* 増量しない	点滴静注	計96時間	day2~5
エンドキサン	1296mg/m2/day		点滴静注	60分	day6
プレドニン	60mg/m2/day		経口		day2~6

【レベル5】

リツキサン	375mg/m2		点滴静注	添書通り	day1
ペプシド	103.7mg/m2/day		点滴静注	計96時間	day2~5
ドキソルビシン	20.7mg/m2/day		点滴静注	計96時間	day2~5
オンコビン	0.4mg/m2/day	* 増量しない	点滴静注	計96時間	day2~5
エンドキサン	1555mg/m2/day		点滴静注	60分	day6
プレドニン	60mg/m2/day		経口		day2~6

【レベル6】

リツキサン	375mg/m2		点滴静注	添書通り	day1
ペプシド	124.4mg/m2/day		点滴静注	計96時間	day2~5
ドキソルビシン	24.8mg/m2/day		点滴静注	計96時間	day2~5
オンコビン	0.4mg/m2/day	* 増量しない	点滴静注	計96時間	day2~5
エンドキサン	1866mg/m2/day		点滴静注	60分	day6
プレドニン	60mg/m2/day		経口		day2~6

CODOX-M療法

薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
エンドキサン	800mg/m2		点滴静注	2hr	day1
エンドキサン	200mg/m2		点滴静注	2hr	day2,3,4,5
オンコビン	1.5mg/m2	2mg/body	点滴静注	30min	day1,8
ドキソルビシン	40mg/m2		点滴静注	30min	day1
メソトレキセート	300mg/m2		点滴静注	1hr	day10
メソトレキセート	2700mg/m2		点滴静注	23hr	day10

Pola+BR療法

薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
リツキサン	375mg/m2		点滴静注	添書通り	day1
ポライビー	1.8mg/kg		点滴静注	90分	day2
トリアキシン	90mg/m2		点滴静注	1hr	day2, 3

【外来】

リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り	day1
ポライビー	1.8mg/kg		点滴静注	90分	day1 (2回目以降30分で)
トレアキシン	90mg/m ²		点滴静注	1hr	day1、2

■ 悪性リンパ種[ホジキン] ■

オブジーボ療法

		1コースの日数		14日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
オブジーボ	240mg/日		点滴静注	30分	day1

ABVd療法

		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドキソルビシン	25mg/m ²		点滴静注	30分	day1,15
ブレオ	9mg/m ²	15mg	点滴静注	1時間	day1,15
エクザール	6mg/m ²	10mg	点滴静注	30分	day1,15
ダカルバジン	375mg/m ²		点滴静注	30分	day1,15

AVD+アドセトリス療法

		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ドキソルビシン	25mg/m ²		点滴静注	30分	day1,15
エクザール	6mg/m ²	10mg	点滴静注	30分	day1,15
ダカルバジン	375mg/m ²		点滴静注	30分	day1,15
アドセトリス	1.2mg/kg	120mg	点滴静注	30分	day1,15

アドセトリス 療法

		1コースの日数		21日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
アドセトリス	1.8mg/kg		点滴静注	30分以上	day1

■ 多発性骨髄腫 ■

■ ベルケイド併用療法 ■

ベルケイド療法

		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【1コース:21日】					
ベルケイド	1.3mg/m ²		静注・皮下		1~8コース day1, 4, 8, 11 (21日を1コース)
デキサメタゾン	20mg/body		経口		ベルケイド投与日と翌日 ベルケイドがday1, 4, 8, 11ならば デキサートはday1,2,4,5,8,9,11,12
【1コース:28日】					
ベルケイド	1.3mg/m ²		静注・皮下		day1, 8, 15 (28日を1コース)
デキサメタゾン	20mg/body		経口		day1, 8, 15 [当院ではDEXもday22は無し]

MPB 療法

		1コースの日数		35日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベルケイド	1.3mg/m ²		静注・皮下		day1,8,15,22 (4投1休)
アルケラン錠	6mg/m ² /日		経口(食前)		day1~4
プレドニン	60mg/m ² /日		経口		day1~4

VCD療法

		1コースの日数		35日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベルケイド	1.3mg/m ²		静注・皮下注		day1,8,15,22
エンドキサン	300mg/m ²		静注	30分	day1,8,15,22
デキサメタゾン	40mg/body/日		経口		day1,8,15,22

JSCT-MM14【scVCD】療法

		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day1,4,8,11
エンドキサン	500mg/m ²		点滴	1hr	day1,8
デキサメタゾン	40mg/body/日		経口		day1,4,8,11

JSCT-MM14【scBor+大量CPA】療法

		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day1,4,8,11
エンドキサン	1500mg/m ²		点滴	3hr	day 8,9

JSCTMM14 scBOR+大量L-PAM療法

		1コースの日数				投与日(1クール)									
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間											
	標準値	上限値			-4	-3	-2	-1	0	1,2	3	4,5	6		
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²		皮下注		↓				↓			↓			

アルケラン	100mg/m2		点滴静注			↓	↓							
PBSCT								↓						

JSCT MM14 scVRD療法

抗癌剤名	1コースの日数		28日		投与日(1クール)									
	1回投与量		投与経路	投与時間	1	8	15	22						
	標準値	上限値												
ボルテゾミブ	1.3mg/m2		皮下注		↓		↓		↓					
レナリドミド	25mg/日				day1~21									
デキサメタゾン	40mg/日				↓		↓		↓			↓		

KRd療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【1サイクル目】					
カイプロリス	20mg/m ²		点滴静注	10min	day1,2
カイプロリス	27mg/m ²		点滴静注	10min	day8,9,15,16
レブラミド	25mg/日		経口		day1~21
レナデックス	20mg/日	カイプロリス30分前までに	経口		day1,2,8,9,15,16,(22,23)
【2~12サイクル目】					
カイプロリス	27mg/m ²		点滴静注	10min	day1,2,8,9,15,16
レブラミド	25mg/日		経口		day1~21
レナデックス	20mg/日	カイプロリス30分前までに	経口		day1,2,8,9,15,16,(22,23)
【13サイクル目以降】					
カイプロリス	27mg/m ²		点滴静注	10min	day1,2,15,16
レブラミド	25mg/日		経口		day1~21
レナデックス	20mg/日	カイプロリス30分前までに	経口		day1,2,8,9,15,16,(22,23)

Kd療法〔週2日投与〕		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【1サイクル目】					
カイプロリス	20mg/m ²		点滴静注	30min	day1,2
カイプロリス	56mg/m ²		点滴静注	30min	day8,9,15,16
レナデックス	経口(カイプロリス30分前までに)				[20mg]day1,2,8,9,15,16,22,23
【2サイクル目以降】					
カイプロリス	56mg/m ²		点滴静注		day1,2,8,9,15,16
レナデックス	経口(カイプロリス30分前までに)				[20mg]day1,2,8,9,15,16,22,23

Kd療法〔週1日投与〕		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【1サイクル目】					
カイプロリス	20mg/m ²		点滴静注	30min	day1
カイプロリス	70mg/m ²		点滴静注	30min	day8,15
レナデックス	経口(カイプロリス30分前までに)				[40mg]day1,8,15,22
【2サイクル目以降】					
カイプロリス	70mg/m ²		点滴静注		day1,8,15
レナデックス	経口(カイプロリス30分前までに)				[40mg]day1,8,15,22

ERd療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【1~2サイクル目】					
エムプリシティ	10mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,8,15,22
レブラミド	25mg/日		経口		day1~21
デキサート注	6.6mg/日	投与45分前までに終了	点滴静注	30min	day1,8,15,22
レナデックス	28mg/日	投与3-24時間前	経口		day1,8,15,22
【3サイクル目以降】					
エムプリシティ	10mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,15
レブラミド	25mg/日		経口		day1~21
デキサート注	6.6mg/日	投与45分前までに終了	点滴静注	30min	day1,15
レナデックス	28mg/日	投与3-24時間前	経口		day1,15
レナデックス	40mg/日		経口		day8,22

EPd療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【1~2サイクル目】					
エムプリシティ	10mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,8,15,22
ポマリスト	1-4mg/日		経口		day1~21
デキサート注	6.6mg/日	投与45分前までに終了	点滴静注	30min	day1,8,15,22
レナデックス	28mg/日	投与3-24時間前	経口		day1,8,15,22
	75歳以上は8mg/日				
【3サイクル目以降】					
エムプリシティ	20mg/kg		点滴静注	添書通り	day1
ポマリスト	1-4mg/日		経口		day1~21
デキサート注	6.6mg/日	投与45分前までに終了	点滴静注	30min	day1
レナデックス	28mg/日	投与3-24時間前	経口		day1
	75歳以上は8mg/日				
レナデックス	40mg/日		経口		day8,15,22
	75歳以上は20mg/日				

DLd療法		1コースの日数		28日		投与日(1クール)
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間		
	標準値	上限値				
【1~2サイクル目】						
ダラザレックス	16mg/kg		点滴静注	添書通り		day1,8,15,22
レブラミド	25mg/日		経口			day1~21
レナデックス	40mg/日	投与1-3時間前	経口			day1,8,15,22[or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23]
【3~6サイクル目】						
ダラザレックス	16mg/kg		点滴静注	添書通り		day1,15
レブラミド	25mg/日		経口			day1~21
レナデックス	40mg/日	投与1-3時間前	経口			day1,8,15,22[or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23]
【7サイクル以降】						
ダラザレックス	16mg/kg		点滴静注	添書通り		day1
レブラミド	25mg/日		経口			day1~21
レナデックス	40mg/日	投与1-3時間前	経口			day1,8,15,22[or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23]

(皮下DARA)DLd療法		1コースの日数		28日		投与日(1クール)
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間		
	標準値	上限値				
【1~2サイクル目】						
ダラキューロ	1800mg/body		皮下注			day1,8,15,22
レブラミド	25mg/日		経口			day1~21
レナデックス	40mg/日	投与1-3時間前	経口			day1,8,15,22[or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23]
↑試験では、75歳以上、BMI<18.5はDEX20mg/週						
【3~6サイクル目】						
ダラキューロ	1800mg/body		皮下注			day1,15
レブラミド	25mg/日		経口			day1~21
レナデックス	40mg/日	投与1-3時間前	経口			day1,8,15,22[or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23]
↑試験では、75歳以上、BMI<18.5はDEX20mg/週						
【7サイクル以降】						
ダラキューロ	1800mg/body		皮下注			day1
レブラミド	25mg/日		経口			day1~21
レナデックス	40mg/日	投与1-3時間前	経口			day1,8,15,22[or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23]
↑試験では、75歳以上、BMI<18.5はDEX20mg/週						

(皮下DARA)DPd療法		1コースの日数		28日		投与日(1クール)
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間		
	標準値	上限値				
【1~2サイクル目】						
ダラキューロ	1800mg/body		皮下注			day1,8,15,22
ポマリスト	1-4mg/日		経口			day1~21
レナデックス	40mg/日	投与1-3時間前	経口			day1,8,15,22[or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23]
↑試験では、75歳以上、BMI<18.5はDEX20mg/週						
【3~6サイクル目】						
ダラキューロ	1800mg/body		皮下注			day1,15
ポマリスト	1-4mg/日		経口			day1~21
レナデックス	40mg/日	投与1-3時間前	経口			day1,8,15,22[or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23]
↑試験では、75歳以上、BMI<18.5はDEX20mg/週						
【7サイクル以降】						
ダラキューロ	1800mg/body		皮下注			day1
ポマリスト	1-4mg/日		経口			day1~21
レナデックス	40mg/日	投与1-3時間前	経口			day1,8,15,22[or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23]
↑試験では、75歳以上、BMI<18.5はDEX20mg/週						

DBd療法		1コースの日数		28日		投与日(1クール)
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間		
	標準値	上限値				
【1~3サイクル目(1コース:21日)】						
ダラザレックス	16mg/kg		点滴静注	添書通り		day1,8,15
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注			day1,4,8,11
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前	経口			day1,2,4,5,8,9,11,12,15,16
【4~8サイクル目(1コース:21日)】						
ダラザレックス	16mg/kg		点滴静注	添書通り		day1
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注			day1,4,8,11
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前	経口			day1,8,15,22
【9サイクル以降(1コース:28日)】						
ダラザレックス	16mg/kg		点滴静注	添書通り		day1
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前	経口			(day1,2)

(皮下DARA)DBd療法		1コースの日数		28日		投与日(1クール)
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間		
	標準値	上限値				

薬剤名	標準値	上限値	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
【1～3サイクル目(1コース:21日)】					
ダラキューロ	1800mg/body		皮下注		day1,8,15
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day1,4,8,11
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,2,4,5,8,9,11,12,15
【4～8サイクル目(1コース:21日)】					
ダラキューロ	1800mg/body		皮下注		day1
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day1,4,8,11
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,8,15 or day1,24,5,8,9,11,12
【9サイクル以降(1コース:28日)】					
ダラキューロ	1800mg/body		皮下注		day1
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前	経口		day1

(皮下DARA)D-MPB療法

抗癌剤名	1コースの日数		1回投与量	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値				
◆1サイクル【1コース:42日】						
ダラキューロ	1800mg/body			皮下注		day1,8,15,22,29,36
ベルケイド	1.3mg/m ²			皮下注		day1,4,8,11,22,25,29,32
アルケラン錠	9mg/m ² /日			経口(食前)		day1～4
プレドニン	60mg/m ² /日			経口		day2～4
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前		経口		day1,8,15,22,29,36
◆2～9サイクル【1コース:42日】						
ダラキューロ	1800mg/body			皮下注		day1,22
ベルケイド	1.3mg/m ²			皮下注		day1,8,22,29
アルケラン錠	9mg/m ² /日			経口(食前)		day1～4
プレドニン	60mg/m ² /日			経口		day2～4
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前		経口		day1,22
◆10サイクル以降【1コース:28日】						
ダラキューロ	1800mg/body			皮下注		day1
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前		経口		day1

IsaKd療法

抗癌剤名	1コースの日数		28日		投与日(1クール)
	1回投与量		投与経路	投与時間	
	標準値	上限値			
【1サイクル目】					
サークリサ	10mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,8,15,22
カイブロリス	20mg/m ²	44mg/body	点滴静注	30min	day1,2
カイブロリス	56mg/m ²	123.2mg/body	点滴静注	30min	day8,9,15,16
レナデックス	経口(カイブロリス30分前までに)		経口		[20mg]day1,2,8,9,15,16,22,23
【2サイクル目以降】					
サークリサ	10mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,15
カイブロリス	56mg/m ²	123.2mg/body	点滴静注	30min	day1,2,8,9,15,16
レナデックス	経口(カイブロリス30分前までに)		経口		[20mg]day1,2,8,9,15,16,22,23

IsaPd療法

抗癌剤名	1コースの日数		28日		投与日(1クール)
	1回投与量		投与経路	投与時間	
	標準値	上限値			
【1サイクル目】					
サークリサ	10mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,8,15,22
ポマリスト	1-4mg/日		経口		day1-21
レナデックス	40mg/日経口(投与15-60分前)		経口		day1,8,15,22
75歳以上は20mg/日					
【2サイクル目以降】					
サークリサ	10mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,15
ポマリスト	1-4mg/日		経口		day1-21
レナデックス	40mg/日経口(投与15-60分前)		経口		day1,8,15,22
75歳以上は20mg/日					

Mel-DEX療法

抗癌剤名	1コースの日数		28日		投与日(1クール)
	1回投与量		投与経路	投与時間	
	標準値	上限値			
アルケラン	0.22mg/kg/日		経口(食前)		day1～4
↑腎機能低下時は75%へ減量					
デキサメタゾン	40mg/日		経口		day1～4
↑体液貯留、反復性心室性不整脈があれば20mg/日、高齢者、PS3-4等					

DCEP療法

抗癌剤名	1コースの日数		1回投与量	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値				
デキサメタゾン	40mg/body			点滴静注	30min	day1,2,3,4

エンドキサン	400mg/m ²		点滴静注	3hr	day1,2,3,4
ペプシド	40mg/m ²		点滴静注	24hr	day1,2,3,4
シスプラチン	10mg/m ²		点滴静注	24hr	day1,2,3,4

■ その他 ■					
アーゼラ療法					
		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【初回】					
アーゼラ	300mg/body		点滴静注	添書通り	day1(初回)
【2回目以降】					
アーゼラ	2000mg/body		点滴静注	添書通り	day8から1週間間隔で、初回を含め計8回 8回目の投与4~5週後から4週間に1回。総計12回

サイメリン療法					
		1コースの日数		数週に1度	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
サイメリン	50~150mg/body		点滴静注	30min	day1

ポテリジオ療法					
		1コースの日数		7日(他剤併用時は14日)	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ポテリジオ	1mg/Kg		点滴静注	2時間	day1

マブキャンパス療法					
		1コースの日数			
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
マブキャンパス	3mg/day		点滴静注	2時間	1日1回3mgの連日点滴静注から開始し、1日1回10mgを連日点滴静注した後、1日1回30mgを週3回隔日に点滴静注
マブキャンパス	10mg/day		点滴静注	2時間	
マブキャンパス	30mg/day		点滴静注	2時間	

R-FCM療法					
		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
フルダラ	25mg/m2		点滴静注	30min	day2~4
エンドキサン	200mg/m2		点滴静注	2hr	day2~4
ノバントロン	8mg/m2		点滴静注	30min	day2~4
リツキサン	375mg/m2		点滴静注	4~5hr	day1

mLSG療法					
		1コースの日数		この化学療法を28日を1	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【a】					
オンコビン	1mg/m2	2mg	点滴静注		day1
エンドキサン	350mg/m2		点滴静注		day1
ドキシソビシン	40mg/m2		点滴静注		day1
プレドニン	40mg/m2		点滴静注		day1
【b】					
ドキシソビシン	30mg/m2		点滴静注		day8
サイメリン	60mg/m2		点滴静注		day8
プレドニン	40mg/m2		点滴静注		day8
【c】					
フィルデシン	2.4mg/m2		点滴静注		day15
ペプシド	100mg/m2		点滴静注		day15~17
カルボプラチン	250mg/m2	or AUC=4.5	点滴静注		day15
プレドニン	40mg/m2		点滴静注		day15~17

アクテムラ療法					
		1コースの日数		14日(1週間まで短縮可)	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
アクテムラ	8mg/kg		点滴静注	60分*	day1
				↑開始後15分間は10ml/hr。その後速度を速め1時間程度で終了 (インタビューフォーム)	

SMILE療法					
		1コースの日数		28日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
メソトレキセート	2g/m2		点滴静注	6hr	day1
イホマイド	1500mg/m2		点滴静注	3hr	day2,3,4
デキサメタゾン	40mg/body		点滴静注	30min	day2,3,4
ペプシド	100mg/m2		点滴静注	2hr	day2,3,4
ロイナーゼ	6000U/m2		点滴静注	2hr	day8,10,12,14,16,18,20

HLH ペプシド療法					
		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			

デキサメタゾン	10mg/m ²		点滴静注	30min	day 1-14
デキサメタゾン	5mg/m ²		点滴静注	30min	day 15-28
デキサメタゾン	2.5mg/m ²		点滴静注	30min	day 29-42
デキサメタゾン	2.5mg/m ²		点滴静注	30min	day 43-56
ペプシド【肝腎】	150mg/m ²		点滴静注	2hr	第1、2週は週2回。その後週1回 d15. 22. 29. 35. 42. 49

■移植■

移植CY+BU療法		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日											
薬剤名	1回投与量		標準値			上限値	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
	標準値	上限値															
ブスルフェクス	3.2mg/kg				点滴静注	3時間			↓	↓	↓						
エンドキサン	60mg/kg				点滴静注	3時間						↓	↓				
造血幹細胞移植 (イメンド)																↓	
(抗てんかん薬)							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

移植MTX(移植後)療法		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日											
薬剤名	1回投与量		標準値			上限値	0	1	...	3	...	6	...	11			
	標準値	上限値															
移植						◎											
メソトレキセート	15mg/m ²				点滴静注	30min		↓									
メソトレキセート	10mg/m ²				点滴静注	30min				↓		↓		↓			

(移植)ブスルファン+チオテパ療法		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日											
薬剤名	1回投与量		標準値			上限値	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
	標準値	上限値															
ブスルフェクス(ブスルファン)	3.2mg/kg				点滴静注	3時間			↓	↓	↓						
リサイオ(チオテパ)	5mg/kg				点滴静注	2時間						↓	↓				
造血幹細胞移植 (グラニセトロン、デキサート)									○	○	○	○	○	○		↓	
(抗てんかん薬)							○	○	○	○	○	○	○	○			

ロイスタチン療法		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)	
抗癌剤名	1回投与量		標準値			上限値	
	標準値	上限値					
ロイスタチン	0.09mg/kg				点滴静注	24時間	day1~7

(皮下DARA)DCyBorD療法		1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)	
抗癌剤名	1回投与量		標準値			上限値	
	標準値	上限値					
◆1~2サイクル目【1コース:28日】							
ダラキューロ	1800mg/body			皮下注		day1,8,15,22	
ベルケイド	1.3mg/m ²			皮下注		day1,8,15,22	
エンドキサン	300mg/m ²	500mg/body		点滴静注	15分	day1,8,15,22	
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前		経口		day1,2,8,9,15,16,22,23	
◆3~6サイクル目【1コース:28日】							
ダラキューロ	1800mg/body			皮下注		day1,15	
ベルケイド	1.3mg/m ²			皮下注		day1,8,15,22	
エンドキサン	300mg/m ²	500mg/body		点滴静注	15分	day1,8,15,22	
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前		経口		day1,2,8,9,15,16,22,23	
◆7サイクル以降【1コース:28日】							
ダラキューロ	1800mg/body			皮下注		day1	
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前		経口		day1	