

血液がんレジメン

■ 急性骨髄性白血病 ■

JALSG AML201 療法

1コースの日数

-

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

イダマイシン

12mg/m²

点滴静注

30min

day1～3

キロサイド

100mg/m²/day

持続点滴

24hr

day1～～7

JALSG AML201療法

1コースの日数

-

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

ダウノマイシン

50mg/m²

点滴静注

30min

day1～5

キロサイド

100mg/m²

持続点滴

24hr

day1～～7

JALSG AML201 地固め1:C1:MA療法

1コースの日数

-

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

キロサイド

200mg/m²

持続点滴

24hr

day1～5

ノバントロン

7mg/m²

点滴静注

30min

day1～3

JALSG AML201 地固め2:C2:DA療法

1コースの日数

-

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

キロサイド

200mg/m²

持続点滴

24hr

day1～～5

ダウノマイシン

50mg/m²

点滴静注

30min

day1～3

JALSG AML201 地固め3:C3:AA療法

1コースの日数

-

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

キロサイド

200mg/m²

持続点滴

24hr

day1～5

アクリノロン

20mg/m²

点滴静注

30min

day1～5

JALSG AML201 地固め4:C4:A-tripleV療法

1コースの日数

-

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

キロサイド

200mg/m²

持続点滴

24hr

day1～5

ベヘンド

100mg/m²

点滴静注

1hr

day1～5

オンコピン

0.8mg/m²

静注

day8

フィリデシン

2mg/m²

静注

day10

HD-AraC療法

1コースの日数

-

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

キロサイド

2000mg/m²/回

点滴静注

必ず3hr

day1～5 :12時間ごと計10回

60歳以上は1500mg/m²/回も考慮

高齢者AML 寛解導入療法

1コースの日数

-

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

キロサイド

90mg/m²/日

持続点滴

24hr

day1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ダウノマイシン

40mg/m²

点滴静注

30min

day1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70歳以上は30mg/m²

高齢者AML地固め1:C1療法

1コースの日数

-

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

キロサイド

90mg/m²/日

持続点滴

24hr

day1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ノバントロン

7mg/m²

点滴静注

30min

day1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70歳以上は5mg/m²

高齢者AML地固め2:C2 療法

1コースの日数

-

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

キロサイド

80mg/m²

持続点滴

24hr

day1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ダウノマイシン

30mg/m²

点滴静注

30min

day1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70歳以上は25mg/m²

ベヘンド

100mg/m²

点滴静注

1hr

day1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70歳以上は75mg/m²

高齢者AML地固め3:C3 療法

1コースの日数

-

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

キロサイド

80mg/m²/日

持続点滴

24hr

day1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

アクリノロン

14mg/m²

点滴静注

30min

day1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70歳以上は10mg/m²へ減量

マイロターグ療法

1コースの日数

14日あけて合計2回まで

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

マイロターグ

9mg/m²

点滴静注

2hr以上

day1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MEC療法

1コースの日数

-

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

ノバントロン

8mg/m²

点滴静注

30min

day 1,2,3

エトポシド【肝腎】

100mg/m²

点滴静注

3hr

day 1,2,3,4,5

キロサイド

100mg/m²/day

持続静注

24hr

day 1,2,3,4,5,6,7

Low dose AraC 療法

1コースの日数

-

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

キロサイド 【14日間投与】

10mg/m²×2回(12hr)

皮下

day1～21

キロサイド 【21日間投与】

10mg/m²×2回(12hr)

皮下

day1～14

CA 療法

1コースの日数

-

抗がん剤名

1回投与量

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

標準値

上限値

投与経路

投与時間

投与日(1クール)

キロサイド

10mg/m²×2回(12hr)

皮下

day1～14

アクリノロン

14mg/m²

点滴静注

30min

day1～4

70歳以上で10mg/m²

* 患者さんの状態に合わせて投与量やスケジュールが変更になることがあります

■ 急性リンパ性白血病 ■					
JALSG ALL202 寛解導入法			1コースの日数		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【25歳以上60歳未満】					
エンドキサン	1200mg/m ²		点滴静注	3hr	day1
ダウノマイシン	60mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,2,3
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg	静注	～30min	day1,8,15,22
ロイナーゼ	3000U/m ²		点滴静注	2hr	day 9,11,13,16,18,20
フレドニン	60mg/m ² /day		経口		day1～14、その後7日で漸減
【60歳以上】					
エンドキサン	800mg/m ²		点滴静注	3hr	day1
ダウノマイシン	30mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,2,3
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg	静注	～30min	day1,8,15,22
ロイナーゼ	3000U/m ²		点滴静注	2hr	day9,11,13,16,18,20
フレドニン	60mg/m ² /day		経口		day1～7、その後7日で漸減

JALSG ALL202-O【地固め療法:C1】療法		1コースの日数					
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)		
	標準値	上限値					
【25歳以上60歳未満】							
キロサイド	2g/m ² /回		点滴静注	3hr	day1,2,3	12hrごと計6回	
ベブシド	100mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,2,3		
デキサート	40mg/body		点滴静注	1hr	day1,2,3		
補注:〔MTX15mg+デキサート4mg〕 day1							
【60歳以上】							
キロサイド	1g/m ² /回		点滴静注	3hr	day1,2,3	12hrごと計6回	
ベブシド	100mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,2,3		
デキサート	40mg/body		点滴静注	1hr	day1,2,3		

JALSG ALL202-O【地固め療法:C2A】療法			1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)	
	標準値	上限値				
【25歳以上50歳未満】						
メトトレキサート	3g/m ²		点滴静注	24h	day1,15	
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg/body	点滴静注		day1,15	
ロイケリン	25mg/m2		経口		day1-21 (分1:眠前)	
メトトレキサート	15mg/body		嚥注		day1,15(MTX開始2時間後から終了までに)	
デキサート	4mg/body		嚥注		day1,15(MTX開始2時間後から終了までに)	
【50歳以上】						
メトトレキサート	1.5g/m ²		点滴静注	24h	day1,15	
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg/body	点滴静注		day1,15	
ロイケリン	25mg/m2		経口		day1-21 (分1:眠前)	
メトトレキサート	15mg/body		嚥注		day1,15(MTX開始2時間後から終了までに)	
デキサート	4mg/body		嚥注		day1,15(MTX開始2時間後から終了までに)	

JALSG ALL202-O【地固め療法:C3】療法		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg/body	点滴静注		day1,8,15
ドキシルビシン	30mg/m ²		点滴静注	1h	day1,8,15
デキサート	10mg/m ²		経口		day1～8 ,15～22
エンドキサン	1g/m ²		点滴静注	3h	day 29
ロイケリン	60mg/m2		経口		day 29～42 (分1:眠前)
キロサイド	75mg/m2		点滴静注	1h	day 29～33 ,36～40

JALSG ALL 維持療法202-O		1コースの日数		
抗癌剤名	1回投与量	投与経路	投与時間	投与日(1クール)
ロイケリン散	60mg/m2		経口(眠前)	day1～28
メトトレキサート錠	20mg/m2		経口(朝後か眠前)	day1,8,15,22
オンコビン	1.3mg/m2	2mg	静注	day1
フレドニン	60mg/m2		経口	day1～5

JALSG Ph+ALL208療法【寛解導入法】		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
エンドキサン	1200mg/m ²		点滴静注	3hr	day1
	└60歳以上は800mg/m ²				
ダウノマイシン	60mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,2,3
	└60歳以上は30mg/m ²				
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg	点滴静注	30min	day1,8,15,22
フレドニン	60mg/m ² /day		経口		day1～21,その後漸減
	└60歳以上はday1-7,その後漸減				
スプリセル	140mg/body/day		経口		day 8-42

JALSG Ph+ALL208療法【地固め療法C1】					
抗癌剤名	1コースの日数		C1、C2を1ヶ月間として1週間には4ヶ月分		投与日 (1クール)
	1回投与量		投与経路	投与時間	
	標準値	上限値			
メトトレキサート	100mg/m ²		点滴静注	1hr	day1
メトトレキサート	900mg/m ²		点滴静注	23hr	day1
キロサイド	2g/m ² /回		点滴静注	3hr	day2,3 (12時間ごと計4回)
	└60歳以上は1g/m2/回				
ソル・メドロール	50mg/body/回		静注		day1,2,3 (12時間ごと計6回)
スプリセル	140mg/body/day		経口		day4-21 (22-28は休業)
MTX15mg+AraC40mg+デキサート4mg			IT		day1

JALSG Ph+ALL208療法【地固め療法C2】					
抗癌剤名	1コースの日数		C1、C2を1ヶ月間として1週間には4ヶ月分		投与日 (1クール)
	1回投与量		投与経路	投与時間	
	標準値	上限値			
エンドキサン	1200mg/m ²		点滴静注	3hr	day1
ダウノマイシン	60mg/m ²		点滴静注	1hr	day1
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg	点滴静注	30min	day1
フレドニン	60mg/m ² /day		経口		day1～7(その後1週間で漸減)
スプリセル	140mg/body/day		経口		day2-21 (22-28は休業)

JALSG Ph+ALL208療法【維持療法】			1コースの日数		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg	点滴静注	30min	day1
ブレドニン	60mg/m ² /day		経口		day1-5
スプリセル	140mg/日		経口		day1-28

EWALL-PH-01 寛解導入療法		1コースの日数			
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
オンコビン	1mg/body		点滴静注	30分	day1,8,15,22
デキサメタゾン	40mg/body		経口		day1,2, 8,9, 15,16, 22,23
→ 70歳以上	20mg/body		経口		day1,2, 8,9, 15,16, 22,23
スプリセル	140mg/body		経口		day1～42
→ 70歳以上	100mg/body		経口		day1～42
triple			髄注		day9,16,23

EWALL-PH-01 地固め療法〔C1,3,5〕		1コースの日数		28日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
スプリセル	100mg/day		経口		day14～27
メトトレキサート	1000mg/m ²		点滴静注	24h	day1
	↑ 70歳以上は500mg/m ²				
ロイナーゼ	10000mg/m ²				day2
	↑ 70歳以上は5000mg/m ²				
triple			髄注		day1 →→ C1とC3のみ

EWALL-PH-01 地固め療法〔C2,4,6〕		1コースの日数		28日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
スプリセル	100mg/day		経口		day14～27
キロサイド	1000mg/m ² /12h毎		点滴静注	2h	day1,2,3 (1日2回×3日→計6回)
	↑ 70歳以上は500mg/m ²				

JALSG Ph+ALL213【先行PSL+寛解導入療法】		1コースの日数		42日(最大49日)	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
プレドニン	60mg/m ²		経口		day1～21 その後30mg/m ² *2日、15mg/m ² *2日、5mg/m ² *3日
スプリセル	140mg/日		分1か2		day8-35
髄注:〔 MTX15mg+デキサート4mg 〕 day22					

JALSG Ph+ALL213【強化地固め療法】		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
エンドキサン	1200mg/m ² └ 60歳以上は900mg/m ²		点滴静注	3hr	day1
ダウノマイシン	45mg/m ² └ 60歳以上は30mg/m ²		点滴静注	1hr	day1,2,3
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg	点滴静注	30min	day1,8,15,22
プレドニン	60mg/m ² /day └ 60歳以上は45mg/m ² /day、その後漸減		経口		day1～21、その後漸減
スプリセル	100mg/body/day		経口		day 4～31

JALSG Ph+ALL213【地固め療法C1】		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
メトトレキサート	100mg/m ²		点滴静注	1hr	day1
メトトレキサート	900mg/m ²		点滴静注	23hr	day1
キロサイド	2000mg/m ² /回 └ 60歳以上は1000mg/m ² /		点滴静注	3hr	day2,3 (12時間ごと計4回)
ソル・メドロール	50mg/body/回		点滴静注	30min	day1,2,3 (12時間ごと計6回)
スプリセル	100mg/body/day		経口		day4～24
髄注:〔 MTX15mg+デキサート4mg 〕 day1					

JALSG Ph+ALL213【地固め療法C2】		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
エンドキサン	1200mg/m ²		点滴静注	3hr	day1
ダウノマイシン	45mg/m ²		点滴静注	1hr	day1
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg	点滴静注	30min	day1
プレドニン	60mg/m ² /day └その後漸減30mg/m ² *2日、15mg/m ² *2日、5mg/m ² *3日		経口		day1～7、その後漸減
スプリセル	100mg/body/day		経口		day2～22
髄注:〔 MTX15mg+デキサート4mg 〕 day1					

JALSG Ph+ALL213【維持療法】		1コースの日数		35日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
オンコビン	1.3mg/m ²	2mg	点滴静注	15min	day1
プレドニン	60mg/m ² /day └その後漸減30mg/m ² *2日、15mg/m ² *2日、5mg/m ² *3日		経口		day1～7、その後漸減
スプリセル	100mg/body/day		経口		day1～28

■ 骨髄異形成症候群 ■														
ビダーザ療法		1コースの日数												
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)									
	標準値	上限値			day1	2	3	4	5	6	7			
ビダーザ	75mg/m2		皮下投与		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
			もしくは		7日間投与									
			点滴静注	10分以上	*月一金投与、土日休み、月火投与の計:7日間投与もあります。									

■ 悪性リンパ種(非ホジキン) ■					
R-CHOP療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
リツキサン	375mg/m2		点滴静注		day1(投与日は様々)
ドキシソビシン	50mg/m2		点滴静注		day2
エンドキサン	750mg/m2		点滴静注		day2
オンコビン	1.4mg/m2	2mg/body	静注		day2
プレドニン	100mg/body/day		経口		day1～5

R-THP-COP療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【通常量】					
ビノルビン	50mg/m2		点滴静注		day2
エンドキサン	750mg/m2		点滴静注		day2
オンコビン	1.4mg/m2	2mg/body	静注		day2
プレドニン	100mg/body/day		経口		day1～5
リツキサン	375mg/m2		点滴静注		day1(投与日は色々です)
【減量】					
ビノルビン	40mg/m2		点滴静注		day2
エンドキサン	650mg/m2		点滴静注		day2
オンコビン	1mg/m2	2mg/body	静注		day2
プレドニン	40mg/m2/day		経口		day1～5
リツキサン	375mg/m2		点滴静注		day1(投与日は色々です)
【減量】					
ビノルビン	30mg/m2		点滴静注		day2
エンドキサン	500mg/m2		点滴静注		day2
オンコビン	1mg/m2	2mg/body	静注		day2
プレドニン	30mg/m2/day		経口		day1～5
リツキサン	375mg/m2		点滴静注		day1(投与日は色々です)

リツキサン療法		1コースの日数		7日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1

薬剤名		1コースの日数		28日	
		1回投与量		投与経路	投与時間
		標準値	上限値		
【1サイクル】					
ガザイバ	1000mg/日		点滴静注	添書通り	day1,8,15
トレアキン	90mg/m2		点滴静注	1hr	day2, 3
【2サイクル以降】					
ガザイバ	1000mg/日		点滴静注	添書通り	day1
トレアキン	90mg/m2		点滴静注	1hr	day1, 2

ガザイバ単独(維持療法)		1コースの日数		2ヶ月	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
ガザイバ	1000mg/日		点滴静注	添書通り	day1

VR-CAP療法		1コースの日数		21日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
リツキサン	375mg/m2		点滴静注		day1(投与日は様々)
ドキシソビシン	50mg/m2		点滴静注		day2
エンドキサン	750mg/m2		点滴静注		day2
ベルケイド	1.3mg/m2		皮下注		day2、5、9、12
プレドニン	100mg/body/day		経口		day1～5

VR-THP-CP療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【通常量】					
ビノルビン	50mg/m ²		点滴静注		day2
エンドキサン	750mg/m ²		点滴静注		day2
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day2、5、9、12
プレドニン	100mg/body/day		経口		day1～5
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1(投与日は色々です)
【減量】					
ビノルビン	40mg/m ²		点滴静注		day2
エンドキサン	650mg/m ²		点滴静注		day2
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day2、5、9、12
プレドニン	40mg/m ² /day		経口		day1～5
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1(投与日は色々です)
【減量】					
ビノルビン	30mg/m ²		点滴静注		day2
エンドキサン	500mg/m ²		点滴静注		day2
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day2、5、9、12
プレドニン	30mg/m ² /day		経口		day1～5
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1(投与日は色々です)

■ サルベージ ■

CHASER 療法

抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日 (1クール)						
	標準値	上限値			1	2	3	4			
エンドキサン	1200mg/m2		点滴静注	day2		↓					
キロサイド	2g/m2		点滴静注	day3,4			↓	↓	↓		
ベブシド	100mg/m2		点滴静注	day2,3,4			↓	↓	↓		
デキサート	40mg/body		点滴静注	day2,3,4			↓	↓	↓		
リツキサン	375mg/m2		点滴静注	day1		↓					

R-DeVIC療法

抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
カルボプラチン	300mg/m ²		点滴静注		day1
ベシド	100mg/m ²		点滴静注		day1,2,3
イホマイド	1500mg/m ²		点滴静注		day1,2,3
デキサート	40mg/body		静注		day1,2,3
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注		day1(投与日は様々)

CPT11+デキサート+VDS療法

抗癌剤名	1コースの日数		21日		投与日 (1クール)											
	1回投与量		投与経路	投与時間												
	標準値	上限値			1	2	3	4	5	-	10	11	12	13	14	
フィルデシン	3mg/body		点滴静注	30min	↓						↓					
イリノテカン	100mg/m2		点滴静注	150min	↓						(↓)					
デキサート	40mg/body		点滴静注	30min	↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	↓	

HD-VP18療法

抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ペブシド	500mg/m2		点滴静注	6～8時間	day1～3

MEL200療法

抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アルケラン	100mg/ m2		点滴静注	30min	day-3, -2
自家末梢血幹細胞移植					day0

LEED療法

抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
アルケラン	130mg/m2		点滴静注		day-1
エンドキサン	60mg/kg		点滴静注		day-4、-3
ベブシド	500mg/m2		点滴静注		day-4、-3、-2
デキサート	40mg/body		点滴静注		day-4、-3、-2、-1
aut-PBSCT(幹細胞移植)					day0

R-MVP療法		1コースの日数	14日間	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		投与日(1クール)
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書参照 day1
メソトレキセート	3.5g/m ²		点滴静注	3hr day2
オンコビン	1.4mg/m ²	2mg/body	点滴静注	30min day2
プロカルバジン	100mg/m ² /日		経口	day1～7【奇数サイクルのみ】

HD-AraC 地固め療法【2日間】		1コースの日数	28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		投与日(1クール)
キロサイド	3000mg/m ²	6000mg/日	点滴静注	必ず3hr day1～2

GDP療法		1コースの日数	21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		投与日(1クール)
ゲムシタビン	1000mg/m ²		点滴静注	30min day1、8
シスプラチン	75mg/m ²		点滴静注	60min day1
デキサート	40(33)mg		経口	day1,2,3,4

GCD(R)療法		1コースの日数	21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		投与日(1クール)
ゲムシタビン	1000mg/m ²		点滴静注	30分 day1、8
カルボプラチン	AUC＝5	750mg	点滴静注	1時間 day1
デキサメタゾン錠	40mg/body		経口	day1～4
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	day8

ベンダムスチン単独療法		1コースの日数	21日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		投与日
トレアキシシ	120mg/m ²		点滴静注	1hr day1、2

R-ベンダムスチン療法		1コースの日数	28日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		投与日
【入院】				
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り day1
トレアキシシ	90mg/m ²		点滴静注	1hr day2、3
【外来】				
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り day1
トレアキシシ	90mg/m ²		点滴静注	1hr day1、2

R-typer CVAD 療法		1コースの日数	21日間	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		投与日
エンドキサン	300mg/m ² /回		点滴静注	3hr 1日2回12時間毎 day1～3 (合計6回)
オンコビン	2mg/body		点滴静注	30min day4,11
ドキソルビシン	50mg/m ²		点滴静注	24h day4
デキサメタゾン	40mg/body		点滴静注	30min day1～4,day11～14
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り day11

R-MA療法		1コースの日数	21日間	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		投与日
メトレキサート	100mg/m ²		点滴静注	1hr day1
メトレキサート	900mg/m ²		点滴静注	23hr day1
キロサイド	2000mg/m ² /回 └ 60歳以上は1000mg/m ² /回		点滴静注	3hr day2,3 (12時間ごと計4回)
ソル・メドロール	50mg/body/回		静注	day1,2,3 (12時間ごと計6回)
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り day10

DA(dose adjusted)-EPOCH-R療法 【標準:レベル1】		1コースの日数		21日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
【標準:レベル1】					
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り	day1
ベブシド	50mg/m ² /day		点滴静注	計96時間	day2～5
ドキソルビシン	10mg/m ² /day		点滴静注	計96時間	day2～5
オンコビン	0.4mg/m ² /day	* 増量しない	点滴静注	計96時間	day2～5
エンドキサン	750mg/m ² /day		点滴静注	60分	day6
ブレドニン	60mg/m ² /day		経口		day2～6
【レベル1】					
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り	day1
ベブシド	50mg/m ² /day		点滴静注	計96時間	day2～5
ドキソルビシン	10mg/m ² /day		点滴静注	計96時間	day2～5
オンコビン	0.4mg/m ² /day	* 増量しない	点滴静注	計96時間	day2～5
エンドキサン	600mg/m ² /day		点滴静注	60分	day6
ブレドニン	60mg/m ² /day		経口		day2～6
【レベル2】					
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り	day1
ベブシド	60mg/m ² /day		点滴静注	計96時間	day2～5
ドキソルビシン	12mg/m ² /day		点滴静注	計96時間	day2～5
オンコビン	0.4mg/m ² /day	* 増量しない	点滴静注	計96時間	day2～5
エンドキサン	900mg/m ² /day		点滴静注	60分	day6
ブレドニン	60mg/m ² /day		経口		day2～6
【レベル3】					
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り	day1
ベブシド	72mg/m ² /day		点滴静注	計96時間	day2～5
ドキソルビシン	14.4mg/m ² /day		点滴静注	計96時間	day2～5
オンコビン	0.4mg/m ² /day	* 増量しない	点滴静注	計96時間	day2～5
エンドキサン	1080mg/m ² /day		点滴静注	60分	day6
ブレドニン	60mg/m ² /day		経口		day2～6
【レベル4】					
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り	day1
ベブシド	86.4mg/m ² /day		点滴静注	計96時間	day2～5
ドキソルビシン	17.3mg/m ² /day		点滴静注	計96時間	day2～5
オンコビン	0.4mg/m ² /day	* 増量しない	点滴静注	計96時間	day2～5
エンドキサン	1296mg/m ² /day		点滴静注	60分	day6
ブレドニン	60mg/m ² /day		経口		day2～6
【レベル5】					
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り	day1
ベブシド	103.7mg/m ² /day		点滴静注	計96時間	day2～5
ドキソルビシン	20.7mg/m ² /day		点滴静注	計96時間	day2～5
オンコビン	0.4mg/m ² /day	* 増量しない	点滴静注	計96時間	day2～5
エンドキサン	1555mg/m ² /day		点滴静注	60分	day6
ブレドニン	60mg/m ² /day		経口		day2～6
【レベル6】					
リツキサン	375mg/m ²		点滴静注	添書通り	day1
ベブシド	124.4mg/m ² /day		点滴静注	計96時間	day2～5
ドキソルビシン	24.8mg/m ² /day		点滴静注	計96時間	day2～5
オンコビン	0.4mg/m ² /day	* 増量しない	点滴静注	計96時間	day2～5
エンドキサン	1866mg/m ² /day		点滴静注	60分	day6
ブレドニン	60mg/m ² /day		経口		day2～6

CODOX-M療法		1コースの日数			
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
エンドキサン	800mg/m2		点滴静注	2hr	day1
エンドキサン	200mg/m2		点滴静注	2hr	day2,3,4,5
オンコビン	1.5mg/m2	2mg/body	点滴静注	30min	day1,8
ドキシソルピシシ	40mg/m2		点滴静注	30min	day1
メソトレキセート	300mg/m2		点滴静注	1hr	day10
メソトレキセート	2700mg/m2		点滴静注	23hr	day10

Pola+BR療法		1コースの日数		21日		投与日
		1回投与量		投与経路	投与時間	
薬剤名	標準値	上限値				
【入院】						
リツキサン	375mg/m2		点滴静注	添書通り	day1	
ボライビー	1.8mg/kg		点滴静注	90分	day2	
トレアキシシ	90mg/m2		点滴静注	1hr	day2、3	
【外来】						
リツキサン	375mg/m2		点滴静注	添書通り	day1	
ボライビー	1.8mg/kg		点滴静注	90分	day1（2回目以降30分で）	
トレアキシシ	90mg/m2		点滴静注	1hr	day1、2	

Pola+R-CHP療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日（1クール）
	標準値	上限値			
リツキサン	375mg/m2		点滴静注		day1(投与日は様々)
ドキシソルピシシ	50mg/m2		点滴静注		day2
エンドキサン	750mg/m2		点滴静注		day2
ボライビー	1.8mg/kg		点滴静注		day2
プレドニン	100mg/body/day		経口		day1～5

Pola+R-CHP(減量ver)療法		1コースの日数		21日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日（1クール）
	標準値	上限値			
リツキサン	375mg/m2		点滴静注		day1(投与日は様々)
ドキシソルピシシ	25mg/m2		点滴静注		day2
エンドキサン	400mg/m2		点滴静注		day2
ボライビー	1.8mg/kg		静注		day2
プレドニン	40mg/m2/day		経口		day1～5

■ 悪性リンパ種〔ホジキン〕 ■ オブジーボ療法		1コースの日数		14日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
オブジーボ	240mg/日		点滴静注	30分	day1

ABVd療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日（1クール）
	標準値	上限値			
ドキシソルピシシ	25mg/m2		点滴静注	30分	day1,15
プレオ	9mg/m2	15mg	点滴静注	1時間	day1,15
エクザール	6mg/m2	10mg	点滴静注	30分	day1,15
ダカルバジン	375mg/m2		点滴静注	30分	day1,15

AVD+アドセトリス療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日（1クール）
	標準値	上限値			
ドキシソルピシシ	25mg/m2		点滴静注	30分	day1,15
エクザール	6mg/m2	10mg	点滴静注	30分	day1,15
ダカルバジン	375mg/m2		点滴静注	30分	day1,15
アドセトリス	1.2mg/kg	120mg	点滴静注	30分	day1,15

アドセトリス 療法		1コースの日数		21日	
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日
	標準値	上限値			
アドセトリス	1.8mg/kg		点滴静注	30分以上	day1

■ 多発性骨髄腫 ■					
ベルケイド療法					
抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
【1コース:21日】					
ベルケイド	1.3mg/m ²		静注・皮下		1～8コース day1, 4, 8, 11 (21日を1コース)
デキサメタゾン	20mg/body		経口		ベルケイド投与日と翌日 ベルケイドがday1, 4, 8, 11ならば デキサートはday1,2,4,5,8,9,11,12
【1コース:28日】					
ベルケイド	1.3mg/m ²		静注・皮下		day1, 8, 15 (28日を1コース)
デキサメタゾン	20mg/body		経口		day1, 8, 15 (当院ではDEXもday22は無し)
VRd-Lite療法					
抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
1～9コース目(1コース35日)					
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下	添書通り	day1,8,15,22 (4投1休)
レブラミド	15mg/日		経口		day1～21
レナデックス	20mg/日		経口		day1,2,8,9,15,16,22,23(76歳以上day1,8,15,22)
10～16コース目(1コース28日)					
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下	添書通り	day1,15
レブラミド	15mg/日		経口		day1～21
MPB 療法					
抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
ベルケイド	1.3mg/m ²		静注・皮下		day1,8,15,22 (4投1休)
アルケラン錠	6mg/m ² /日		経口(食前)		day1～4
フレドニン	60mg/m ² /日		経口		day1～4
VCD療法					
抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
ベルケイド	1.3mg/m ²		静注・皮下注		day1,8,15,22
エンドキサン	300mg/m ²		静注	30分	day1,8,15,22
デキサメタゾン	40mg/body/日		経口		day1,8,15,22
JSCT-MM14【soVCD】療法					
抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day1,4,8,11
エンドキサン	500mg/m ²		点滴	1hr	day1,8
デキサメタゾン	40mg/body/日		経口		day1,4,8,11
JSCT-MM14【soBor+大量CPA】療法					
抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day1,4,8,11
エンドキサン	1500mg/m ²		点滴	3hr	day 8,9
JSCTMM14 soBOR+大量L-PAM療法					
抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²		皮下注		↓
アルケラン	100mg/m ²		点滴静注		↓
PBSCT					↓
JSCT MM14 soVRD療法					
抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²		皮下注		↓
レナリドミド	25mg/日				↓
デキサメタゾン	40mg/日				↓
KRd療法					
抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
【1サイクル目】					
カイプロリス	20mg/m ²		点滴静注	10min	day1,2
カイプロリス	27mg/m ²		点滴静注	10min	day8,9,15,16
レブラミド	25mg/日		経口		day1～21
レナデックス	20mg/日	※7/230分前までに	経口		day1,2,8,9,15,16,(22,23)
【2～12サイクル目】					
カイプロリス	27mg/m ²		点滴静注	10min	day1,2,8,9,15,16
レブラミド	25mg/日		経口		day1～21
レナデックス	20mg/日	※7/230分前までに	経口		day1,2,8,9,15,16,(22,23)
【13サイクル目以降】					
カイプロリス	27mg/m ²		点滴静注	10min	day1,2,15,16
レブラミド	25mg/日		経口		day1～21
レナデックス	20mg/日	※7/230分前までに	経口		day1,2,8,9,15,16,(22,23)
Kd療法【週2日投与】					
抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
【1サイクル目】					
カイプロリス	20mg/m ²		点滴静注	30min	day1,2
カイプロリス	56mg/m ²		点滴静注	30min	day8,9,15,16
レナデックス	経口(※7/230分前までに)				[20mg]day1,2,8,9,15,16,22,23
【2サイクル目以降】					
カイプロリス	56mg/m ²		点滴静注		day1,2,8,9,15,16
レナデックス	経口(※7/230分前までに)				[20mg]day1,2,8,9,15,16,22,23
Kd療法【週1日投与】					
抗癌剤名	1コースの日数		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	1回投与量				
	標準値	上限値			
【1サイクル目】					
カイプロリス	20mg/m ²		点滴静注	30min	day1
カイプロリス	70mg/m ²		点滴静注	30min	day8,15
レナデックス	経口(※7/230分前までに)				[40mg]day1,8,15,22
【2サイクル目以降】					
カイプロリス	70mg/m ²		点滴静注		day1,8,15
レナデックス	経口(※7/230分前までに)				[40mg]day1,8,15,22

ERd療法		1コースの日数		28日		投与日(1クール)
		1回投与量		投与経路	投与時間	
		標準値	上限値			
抗癌剤名						
【1～2サイクル目】						
エムブリシディ		10mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,8,15,22
レブラミド		25mg/日		経口		day1～21
デキサート注		6.6mg/日	投与45分前までに終了	点滴静注	30min	day1,8,15,22
レナデックス		28mg/日	投与3～24時間前	経口		day1,8,15,22
【3サイクル目以降】						
エムブリシディ		10mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,15
レブラミド		25mg/日		経口		day1～21
デキサート注		6.6mg/日	投与45分前までに終了	点滴静注	30min	day1,15
レナデックス		28mg/日	投与3～24時間前	経口		day1,15
レナデックス		40mg/日		経口		day8,22

EPd療法		1コースの日数		28日		投与日(1クール)
		1回投与量		投与経路	投与時間	
		標準値	上限値			
【1～2サイクル目】						
エムブリシディ		10mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,8,15,22
ボマリスト		1~4mg/日		経口		day1~21
デキサート注		6.6mg/日	投与45分前までに終了	点滴静注	30min	day1,8,15,22
レナデックス		28mg/日	投与3~24時間前	経口		day1,8,15,22
		75歳以上は8mg/日				
【3サイクル目以降】						
エムブリシディ		20mg/kg		点滴静注	添書通り	day1
ボマリスト		1~4mg/日		経口		day1~21
デキサート注		6.6mg/日	投与45分前までに終了	点滴静注	30min	day1
レナデックス		28mg/日	投与3~24時間前	経口		day1
		75歳以上は8mg/日				
レナデックス		40mg/日		経口		day8,15,22
		75歳以上は20mg/日				

DLd療法		1コースの日数		28日		投与日(1クール)
		1回投与量		投与経路	投与時間	
		標準値	上限値			
抗癌剤名						
【1～2サイクル目】						
ダラザレックス		16mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,8,15,22
レブラミド		25mg/日		経口		day1～21
レナデックス		40mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,8,15,22(or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23)
【3～6サイクル目】						
ダラザレックス		16mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,15
レブラミド		25mg/日		経口		day1～21
レナデックス		40mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,8,15,22(or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23)
【7サイクル以降】						
ダラザレックス		16mg/kg		点滴静注	添書通り	day1
レブラミド		25mg/日		経口		day1～21
レナデックス		40mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,8,15,22(or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23)

(皮下DARA)DLd療法		1コースの日数		28日		投与日(1クール)
		1回投与量		投与経路	投与時間	
		標準値	上限値			
抗癌剤名						
【1～2サイクル目】						
ダラキューロ		1800mg/body		皮下注		day1,8,15,22
レブラミド		25mg/日		経口		day1～21
レナデックス		40mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,8,15,22〔or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23〕
		↑試験では、75歳以上、BMI<18.5はDEX20mg/週				
【3～6サイクル目】						
ダラキューロ		1800mg/body		皮下注		day1,15
レブラミド		25mg/日		経口		day1～21
レナデックス		40mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,8,15,22〔or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23〕
		↑試験では、75歳以上、BMI<18.5はDEX20mg/週				
【7サイクル以降】						
ダラキューロ		1800mg/body		皮下注		day1
レブラミド		25mg/日		経口		day1～21
レナデックス		40mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,8,15,22〔or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23〕
		↑試験では、75歳以上、BMI<18.5はDEX20mg/週				

抗癌剤名		1コースの日数		28日		投与日(1クール)
		1回投与量		投与経路	投与時間	
		標準値	上限値			
【1～2サイクル目】						
ダラキューロ		1800mg/body		皮下注		day1,8,15,22
ボマリスト		1～4mg/日		経口		day1～21
レナデックス		40mg/日	投与1～3時間前	経口		day1,8,15,22〔or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23〕
↑試験では、75歳以上、BMI<18.5はDEX20mg/週						
【3～6サイクル目】						
ダラキューロ		1800mg/body		皮下注		day1,15
ボマリスト		1～4mg/日		経口		day1～21
レナデックス		40mg/日	投与1～3時間前	経口		day1,8,15,22〔or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23〕
↑試験では、75歳以上、BMI<18.5はDEX20mg/週						
【7サイクル以降】						
ダラキューロ		1800mg/body		皮下注		day1
ボマリスト		1～4mg/日		経口		day1～21
レナデックス		40mg/日	投与1～3時間前	経口		day1,8,15,22〔or20mg/day1,2,8,9,15,16,22,23〕
↑試験では、75歳以上、BMI<18.5はDEX20mg/週						

DBd療法		1コースの日数					
		1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)	
		標準値	上限値				
抗癌剤名							
【1～3サイクル目(1コース:21日)】							
ダラザレックス		16mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,8,15	
ベルケイド		1.3mg/ml		皮下注		day1,4,8,11	
レナデックス		20mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,2,4,5,8,9,11,12,15,16	
【4～8サイクル目(1コース:21日)】							
ダラザレックス		16mg/kg		点滴静注	添書通り	day1	
ベルケイド		1.3mg/ml		皮下注		day1,4,8,11	
レナデックス		20mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,8,15,22	
【9サイクル以降(1コース:28日)】							
ダラザレックス		16mg/kg		点滴静注	添書通り	day1	
レナデックス		20mg/日	投与1-3時間前	経口		(day1,2)	

(皮下DARA)DBd療法		1コースの日数				投与日(1クール)
		1回投与量		投与経路	投与時間	
		標準値	上限値			
抗癌剤名						
【1～3サイクル目(1コース:21日)】						
ダラキューロ		1800mg/body		皮下注		day1,8,15
ベルケイド		1.3mg/㎡		皮下注		day1,4,8,11
レナデックス		20mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,2,4,5,8,9,11,12,15
【4～8サイクル目(1コース:21日)】						
ダラキューロ		1800mg/body		皮下注		day1
ベルケイド		1.3mg/㎡		皮下注		day1,4,8,11
レナデックス		20mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,8,15 or day1,24,5,8,9,11,12
【9サイクル以降(1コース:28日)】						
ダラキューロ		1800mg/body		皮下注		day1
レナデックス		20mg/日	投与1-3時間前	経口		day1

(皮下DARA)D-MPB療法

皮下DARA/D-MPB療法		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
◆1サイクル【1コース:42日】					
ダラキユーロ	1800mg/body		皮下注		day1,8,15,22,29,36
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day1,4,8,11,22,25,29,32
アルケラン錠	9mg/m ² /日		経口 (食前)		day1～4
ブレドニン	60mg/m ² /日		経口		day2～4
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,8,15,22,29,36
◆2～9サイクル【1コース:42日】					
ダラキユーロ	1800mg/body		皮下注		day1,22
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day1,8,22,29
アルケラン錠	9mg/m ² /日		経口 (食前)		day1～4
ブレドニン	60mg/m ² /日		経口		day2～4
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,22
◆10サイクル以降【1コース:28日】					
ダラキユーロ	1800mg/body		皮下注		day1
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前	経口		day1

IsaKd療法

IsaKd療法	1コースの日数		28日		投与日 (1クール)
	1回投与量		投与経路	投与時間	
抗癌剤名	標準値	上限値			
【1サイクル目】					
サークリサ	10mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,8,15,22
カイプロリス	20mg/m2	44mg/body	点滴静注	30min	day1,2
カイプロリス	56mg/m2	123.2mg/body	点滴静注	30min	day8,9,15,16
レナデックス	経口 (カイロ D1530分前までに)		経口		[20mg]day1,2,8,9,15,16,22,23
【2サイクル目以降】					
サークリサ	10mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,15
カイプロリス	56mg/m2	123.2mg/body	点滴静注	30min	day1,2,8,9,15,16
レナデックス	経口 (カイロ D1530分前までに)		経口		[20mg]day1,2,8,9,15,16,22,23

IsaPd療法

1aPd療法		1コースの日数		28日	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
【1サイクル目】					
サークリサ	10mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,8,15,22
ボマリスト	1~4mg/日		経口		day1~21
レナデックス	40mg/日経口(投与15~60分前)		経口		day1,8,15,22
75歳以上は20mg/日					
【2サイクル目以降】					
サークリサ	10mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,15
ボマリスト	1~4mg/日		経口		day1~21
レナデックス	40mg/日経口(投与15~60分前)		経口		day1,8,15,22
75歳以上は20mg/日					

Isad療法

lead療法	1コースの日数		28日		投与日 (1クール)
	1回投与量		投与経路	投与時間	
	標準値	上限値			
【1サイクル目】					
サークリサ	20mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,8,15,22
レナデックス	40mg/日経口 (投与15-60分前)		経口		day1,8,15,22
75歳以上は20mg/日					
【2サイクル目以降】					
サークリサ	20mg/kg		点滴静注	添書通り	day1,15
レナデックス	40mg/日経口 (投与15-60分前)		経口		day1,8,15,22
75歳以上は20mg/日					

MeI-DEX療法

MeI-DEX療法	1コースの日数		28日		投与日(1クール)	
	1回投与量		投与経路	投与時間		
	標準値	上限値				
抗癌剤名						
アルケラン	0.22mg/kg/日		経口(食前)	day1～4		
	↑腎機能低下時は75%へ減量					
デキサメタゾン	40mg/日		経口	day1～4		
	↑体液貯留、反復性心室性不整脈があれば20mg/日、高齢者、PS3-4等					

DCEP療法

抗癌剤名	1コースの日数		28日		投与日 (1クール)
	標準値	上限値	投与経路	投与時間	
デキサメタゾン	40mg/body		点滴静注	30min	day1,2,3,4
エンドキサン	400mg/m ²		点滴静注	3hr	day1,2,3,4
ベブシド	40mg/m ²		点滴静注	24hr	day1,2,3,4
シスプラチン	10mg/m ²		点滴静注	24hr	day1,2,3,4

■ その他 ■

アーゼラ療法

抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日 (1クール)
	標準値	上限値			
【初回】					
アーゼラ	300mg/body		点滴静注	添書通り	day1 (初回)
【2回目以降】					
アーゼラ	2000mg/body		点滴静注	添書通り	day8から1週間間隔で、初回を含め計8回 8回目の投与4～5週後から4週間に1回、総計12回

サイメリン療法

サイメリン療法		1コースの日数		数週に1度	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
サイメリン	30~150mg/ body w		点滴静注	30min	day1

ボテリジオ療法

ポテリジオ療法		1コースの日数		7日(他剤併用時は14日)	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
ポテリジオ	1mg/Kg		点滴静注	2時間	day1

マブキャンパス療法

マブキャンパス療法		1コースの日数				
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日	
	標準値	上限値				
マブキャンパス	3mg/day		点滴静注	2時間		
マブキャンパス	10mg/day		点滴静注	2時間		
マブキャンパス	30mg/day		点滴静注	2時間		
					1日1回3mgの連日点滴静注から開始し、1日1回10mgを連日点滴静注した後、1日1回30mgを週3回隔日に点滴静注	

R-FCM療法

R-FCM療法		1コースの日数			
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)
	標準値	上限値			
フルダラ	25mg/m2		点滴静注	30min	day2~4
エンドキサン	200mg/m2		点滴静注	2hr	day2~4
ノバントロン	8mg/m2		点滴静注	30min	day2~4
リツキサン	375mg/m2		点滴静注	4~5hr	day1

mLSQ療法

mLSG療法		1コースの日数		Dの化学療法を 28日を1	
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日（1クール）
	標準値	上限値			
【a】					
オンコビン	1mg/m2	2mg	点滴静注		day1
エンドキサン	350mg/m2		点滴静注		day1
ドキソルビシン	40mg/m2		点滴静注		day1
ブレドニン	40mg/m2		点滴静注		day1
【b】					
ドキソルビシン	30mg/m2		点滴静注		day8
サイメリン	60mg/m2		点滴静注		day8
ブレドニン	40mg/m2		点滴静注		day8
【c】					
フィルデシン	2.4mg/m2		点滴静注		day15
ベプシド	100mg/m2		点滴静注		day15～17
カルボプラチン	250mg/m2	or AUC＝4.5	点滴静注		day15
ブレドニン	40mg/m2		点滴静注		day15～17

1コースの日数		14日(1週間まで短縮可)		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		
アクトムラ	8mg/kg		点滴静注	60分*
				day1
				1開始後15分間は10ml/hr。その後速度を速め1時間程度で終了(インタビューフォーム)

1コースの日数		28日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		
メソトレキセート	2g/m2		点滴静注	6hr
イホマイド	1500mg/m2		点滴静注	3hr
デキサメタゾン	40mg/body		点滴静注	30min
ベブシド	100mg/m2		点滴静注	2hr
ロイナーゼ	6000U/m2		点滴静注	2hr
				day1
				day2,3,4
				day2,3,4
				day2,3,4
				day8,10,12,14,16,18,20

1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		
デキサメタゾン	10mg/m2		点滴静注	30min
デキサメタゾン	5mg/m2		点滴静注	30min
デキサメタゾン	2.5mg/m2		点滴静注	30min
デキサメタゾン	2.5mg/m2		点滴静注	30min
ベブシド【肝腎】	150mg/m2		点滴静注	2hr
				day 1-14
				day 15-28
				day 29-42
				day 43-56
				第1,2週は週2回。その後週1回 d15, 22, 29, 35, 42, 49

■移植■

1コースの日数		28日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		
ブスルフェクス	3.2mg/kg		点滴静注	3時間
エンドキサン	60mg/kg		点滴静注	3時間
造血幹細胞移植				
(イメンド)				
(抗てんかん薬)				
				## -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
				↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
				○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
				○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1コースの日数		28日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		
移植				
メソトレキセート	15mg/m2		点滴静注	30min
メソトレキセート	10mg/m2		点滴静注	30min
				0 1 ... 3 ... 6 ... 11
				@
				↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1コースの日数		28日		
薬剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		
ブスルフェクス(ブスルファン)	3.2mg/kg		点滴静注	3時間
リサイオ(チオハ)	5mg/kg		点滴静注	2時間
造血幹細胞移植				
(グラニセトロン、デキサート)				
(抗てんかん薬)				
				## -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
				↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
				○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
				○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		
ロイスタチン	0.08mg/kg		点滴静注	24時間
				day1～7

皮下DARA/DocyBorD療法		1コースの日数					
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間	投与日(1クール)		
	標準値	上限値					
◆1～2サイクル目【1コース:28日】							
ダラキューロ	1800mg/body		皮下注		day1,8,15,22		
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day1,8,15,22		
エンドキサン	300mg/m ²	500mg/body	点滴静注	15分	day1,8,15,22		
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,2,8,9,15,16,22,23		
◆3～6サイクル目【1コース:28日】							
ダラキューロ	1800mg/body		皮下注		day1,15		
ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注		day1,8,15,22		
エンドキサン	300mg/m ²	500mg/body	点滴静注	15分	day1,8,15,22		
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前	経口		day1,2,8,9,15,16,22,23		
◆7サイクル以降【1コース:28日】							
ダラキューロ	1800mg/body		皮下注		day1		
レナデックス	20mg/日	投与1-3時間前	経口		day1		

1コースの日数		28日		
抗癌剤名	1回投与量		投与経路	投与時間
	標準値	上限値		
リツキサン	500mg/m ²	～2回目以降の用量	点滴静注	day1
エンドキサン	150mg/m2		経口	day1-5または2-6(5日間)
フルダラ	24mg/m2		経口	day1-5または2-6(5日間)